

中腸頂部被害

雄花抽穗前
防治最有效

目前玉米螟推廣防治方法有前表中所列7種。施藥部位，雄花抽穗前以心葉部爲主，抽穗後以果穗部及莖部爲主，但雄花抽穗後不可使用粒劑。

在玉米整個生育過程中，何時防治玉米螟最有效？以生育初期、雄花抽穗前及雄花抽穗後等3個不同時期而言，以雄花抽穗前最有效。因爲玉米螟喀好在玉米雄花抽穗前產卵，孵化幼虫集中於心葉部爲害有關。

推廣藥劑中
粒劑效果較好

表中所列7種防治方法中，目前在台南地區概以粒劑防治效果較噴霧劑爲佳。粒劑中以「陶斯松」爲最佳，「加保扶」、「大福松」、「丁基加保扶」等

親愛的農友兄弟：

在這講究好品質才有高價格的農業技術更新時代，您們所栽培的瓜、果樹、蔬菜、甘蔗、花卉、育苗、茶葉、菸草等農作物，如遇各種生理與土壤所引起疑難不解之症狀，如何適當提高產量與改良品質等問題，請通知本公司爲您提供服務。

一、施肥設計：適當的施肥避免過量所引起肥害、病害浪費金錢、勞力。市面上的有機肥料及無機要素、種類複雜、品質不穩定，各有優劣，建議您如何選擇理想產品。

二、土壤分析：無機肥料、重金屬要素施用不當產生土壤變質，如何恢復地力及連作所引起敗植問題。


三、植物營養：要素不平衡所引起生理病變畸形果葉變（花葉）以上各種作物生長畸形、流花、落果、花芽、花苞、形成不良等診斷防治，歡迎農業界專家提携指導，協助克服本省土壤危機。

▼提供：自配有機肥原料、要素、泥炭、炭化稻殼及其他有機原料

大益農有機股份有限公司技術服務部
台中縣大甲鎮中山路一段484巷8號
服務專線（〇四六）八六三一八九・八七七三五九

GALLAGHER
電牧器
——現代化牧場標緻

紐西蘭蓋洛哈電牧器，風行世界100餘國，可強化您的圍籬，減少人力浪費，提高牧草的利用率：



- 電力輸出大，有效管理您的牛、羊、馬、猪等。
- 有交流、直流及二用型。
- 節省管理費用及時間。
- 安裝容易，維護簡單。

詳情請洽詢：
總代理：漢紐實業有限公司
台北市仁愛路二段110號2樓
電　話：(02)3215671(代表線)