播種時期

蔬筍的種子發芽比一般作物種子發芽慢，尤其溫度低時，發芽更慢，根據試驗結果，發芽溫度在 25° C～30° C時，須10天左右，15° C須30天， 20° C須22天， 24° C須15天，因此育苗時，宜避開冬季，12月～翌年2月低溫期播種，同時，播種發芽初期易受雨水沖刷及浸泡，因此也需避免在雨季播種，根據上述條件，本省適合播種期以每年3月～4月及9月～10月最適宜。

育苗床準備

1.育苗圃土壤：蔬筍苗圃須選擇排水良好，通氣性佳，不曾栽過蔬筍的沙質壤土。

2.基肥：整地前先施用基肥，每公頃堆肥2萬公斤、尿素150公斤、氯化鉀 100公斤、過磷酸鈣120公斤、或台肥1號複合肥料 400公斤，有地下害蟲的土地，宜同時撒施好年冬粒劑，以防止地下害蟲。好年冬粒劑用量每10公畝4～6公斤。

3.苗床：整理好的育苗地，用人工或曳引機做成1.2 公尺寬的高畦，畦面須充分整平，以利灌水，同時爲避免豪雨，做高畦時，畦溝要深，以期排水能順暢。

種子浸種和消毒

播種前應先用25° C～30° C的清水浸種24～48小時，以提高發芽率和使發芽整齊，浸種時需換水2～3次，並除去浮在水面不充實的種子，經浸種和拌過殺菌劑後的種子（種子已消毒過的，可免再拌殺菌劑），應立即播種，並隨後灌水，因爲此時的種子已吸水膨脹，並且胚已開始發動生長，只是未突破種皮而已，若浸種後，未能及時播種，或播種後未能立即灌水，而導致種子脫水乾燥，將會降低發芽率，要避免。若人工不足時，宜分次浸種，分次播種，以保持浸完種後立即能播種。

（未完・下期續）

彩色實用食譜大贈送



訂閱指南雜誌一年（12期）650元
贈送：中視叢書「實用食譜」
或「鳳情千千萬」錄音帶
或「鄭少秋專輯」錄音帶
或「我是中國人」錄音帶

郵政劃撥一五四五〇帳號・中視出版部
電話：七四一—〇七五九・七一一—〇三一二