成長期間的仔羊，除了給予充份良質牧草（乾草）外，並要適當的運動和補充精料（大豆餅、大豆粉、玉米等穀類），務必充分供給生長所需的足夠營養分。


此外應注意內外寄生虫的防治，尤以胃虫的驅除，及定期外寄生虫的防治，不可忽視。

羊舍涼爽乾燥

羊舍的建造，以排水良好、乾燥不潮濕、通風完善及舖設高架條狀羊床（羊喜歡棲息在床架上）者，可維持羊羣健康及衞生。

羊舍內需設鹽槽及清潔飲水，讓羊隻自由採食。飼料槽放在羊舍外讓羊頭伸出可吃到，但不要讓羊的脚踏入飼料槽內，以防止汚染食物。

最好給你的羊羣搭建一個涼快、乾燥，可以防雨的羊棚，不必是鋼筋水泥磚造，可以茅草、竹子、木材，甚至棕梠葉等材料搭羊舍，因隔熱性及絕緣良好



羊喜歡棲息在條狀床架上


，非常適宜羊居住。

羊舍要注意屋頂部分的通風，使室內的溫度與室外的溫度相似，不可有溫差。尤其不可將門窗緊閉，以免溫差及空氣汚濁使乳羊得肺炎，導致羊隻死亡的損失。山羊原本生長在野地、山區、沙漠，那裏的空氣清潔又乾燥，羊羣以小家庭方式聚集生活，此習性應加以了解。

羊舍不可潮濕，潮濕會引致多種疾病發生。如果走進羊舍就嗅到氨的氣味，就是潮濕現象，對小羊尤其不好。

母羊與仔羊應分別管理；母羊放牧，仔羊則放在家裏。母羊早上放牧出去，傍晚返羊舍時擠乳，夜晚讓母羊和仔羊一起過夜。

撒能乳羊如果一天的產乳量在2公斤以下，擠一次乳就可以了，不影响放牧。母羊返羊舍時加給精料或良好的草料。下雨時應趕回羊舍。



榨乳前後的清潔、消毒工作不可免。

確使羊乳清潔

羊乳是供人飲用的食品，必須絕對乾淨，不受細菌汚染，擠乳前的清潔工作不可省略。

擠乳前，先以清潔的溫水浸濕毛巾，小心把乳房擦洗乾淨。人蹲於母羊側面，以右手的拇指與食指緊握乳頭根部，依次按中指、無名指、小指的順序，握緊拳頭，如此乳汁即可流出。以清潔的容器（鋁質乳桶或ST、PC水桶皆可）接存。

羊乳擠出後即用雙層紗布過濾，倒入不銹鋼製的集乳桶中，放入冷却槽或冷水槽冷却。過程中以急速冷却效果較佳。使用過的容器要充分清洗，並用乾燥殺菌箱或日光晒乾以防細菌滋生，影响乳汁品質。

羊乳需經過完全消毒殺菌方可飲用。家庭式消毒，通常採用間接加熱煮沸法，即將羊乳盛於容器中，外鍋加水煮沸，靠蒸氣的熱度達到殺菌的目的。如大規模的處理羊乳消毒，就需要一套完整的設備，如市售的蒸乳箱或蒸氣高壓消毒設備。

痛惜公羊·留鬚悼念

據聯合報8月31日載，苗栗市養了大批山羊的市民代表鄭興來，最近因痛惜一頭種公羊病死，不但將牠厚葬，自己也留起「山羊鬍」表示悼念。

前年開始在苗栗市西山放牧山羊的鄭興來，羊羣最多時有五、六十頭，這些山羊幾乎都是這頭病死的公羊所交配繁殖的，因此，特別寵愛這頭公羊。

半個月前，這頭公羊開始食慾不振，他雖請獸醫醫治，可是仍舊無效。曾有屠宰商想向他買下宰殺，但遭他堅拒。

一個星期前，這頭公羊病死了，他因心裏難過，不但厚葬牠，且留起「山羊鬍」。