

理想品種的特性

爲了改進本省荔枝生產，嘉義農業試驗分所承農發會經費補助，在台灣省農業試驗所主持下，已進行二年之荔枝育種工作。初步自本省調查到20個已命名之品種及20餘未命名之實生品系，自其中選出4種優良品系，正進一步觀察中。在此筆者歡迎本省農友如發現有優良植株，立刻和嘉義農業試驗分所聯絡。

理想荔枝品種的特性爲：

1.具有不同於黑葉之成熟期，如較早或較晚者均可，尤以早生種爲佳，如三月紅，比黑葉早20~30日就是。


2.產量高，適應性廣之品種，可在本省各地種植，不易因氣候等環境因素而減產如黑葉。

3.品質及風味優良，糖度高，含水量低，具有糯米糍之清香，在6~7分熟時果實酸味即下降而可食用。如糯米糍、玉荷包。

4.果實大，果肉厚，種子小，小核率及果肉率均高，如沙坑及玉荷包。

5.果色鮮艷呈鮮紅色如紅皮種，果棘平滑不易刺手如黑葉種。

6.生長勢強，易於繁殖及整枝修剪如玉荷包。



糯米糍

7.抗露疫病，裂果率低。

8.耐貯藏及適合加工。

事實上要獲得完全符合上述條件之品種極爲困難，如能滿足其中2~3項已屬難得。

不同地區應種植 不同成熟期品種

由於以往多種植黑葉種，加以荔枝產期短，同一植株在20天內幾已全採收完，且不耐貯藏，因此使本省荔枝價格起伏極大，早採者可達每台斤100元以上，盛產期則降至每台斤3~4元，不敷成本。爲解決此一問題，應推廣不同成熟期品種於不同地區。

本省荔枝品種如果依成熟期分類，可大致分成5類：

極早熟（比黑葉早約20天）：如三月紅。

早熟種（比黑葉早約10天）：如玉荷包、紅皮、高雄早生。

中熟種（成熟期與黑葉同）：如黑葉、沙坑、狀元紅、萬年紅。

這是一個事實

全世界

1500000000

人口向您證明

100%大豆沙拉油

100%不含膽固醇



美國黃豆協會