縮短至4～5公尺，不但可經由增加單位面積株數而提高產量，亦可較早獲得回收。

秋冬季抑制新梢生長以防止隔年結果

荔枝植株全年均可能發生新梢，尤以6、7、8、9月爲多，但如在10月以後仍然發生新梢，往往無法花芽分化而不能於次年結果，因此栽培荔枝必須在10月以後至開花前除去所發生的新梢。

新梢如發生少量，可用人工摘除，但如大面積栽培，可在9月間以刻傷或環狀剝皮，抑制植株生長。

10月中旬以後發生新梢，則以下列藥劑處理：

・Ethrel 200 ppm（商品名：益收）。

・KH_2PO_4（第一磷酸鉀）300～400倍。

以往亦有以五氯酚鈉（PCP）600 倍或巴拉刈3,000 倍處理新梢，但五氯酚鈉目前已禁止使用，而巴拉刈如果使用不當，極易造成葉片損傷而影響植株生長。

基本上要抑制營養生長，須從施肥方面着手。施肥以1年2次爲宜：第1次在開花前1個月（花穗抽出時）施用，施全年量之10分之7；第二次在果實發育期，施用其餘之10分之3，尤其須注意第2次施肥不可太多，亦不可過遲，否則在秋冬季極易發生新梢而影響次年結果。生長勢較弱的品種，可於第2次施略多的化學肥，以於7月間促進新梢之生長。



三月紅

TOTAL IRRIGATION SYSTEMS
GREEN RAIN
粒粒果實皆需露水的滋潤！
條條魚蝦皆需新鮮的空氣！
您希望提高產量與品質嗎？
讓綠水來解決您的問題吧！

噴灌 滴灌 噴泉
噴霧 加濕 給氧
全自動控制系統

● 所有相關器材銷售總滙
● 規劃、設計、估價、施工、顧問
● 優良的品質，信譽的保證

台灣綠水股份有限公司
TEL:(02)5375670～1

最新奇 特殊土壤改良劑
鎂綠要素®
是改善水果、蔬菜品質的秘方
含有：高單位鎂質、鈣質及植物生長必需微量要素。
◎地面灑佈，使用方便
◎改良土壤，控制[illegible]
◎健樹養根，防止落果
◎改良果實品質，增加甜度
（詳細說明書，備索）
徵求銷售商
立晟化工廠有限公司
台中市[illegible]龍街57-3號
☎公司：042-229055 工廠：042-792820