

種配合種植，才可結果良好。即使是不同品種，只要開花習性相同，仍不能授粉。但是 Hass 品種是例外，雖然種植單一品種，仍可結果良好。

一般以春季 3~4 月和秋季 11 月為栽植（定植）適期。栽植距離 6~12 公尺，依氣候、土壤、品種而定。

在美國加州，最初都以 5×5 公尺的距離栽植，以後再間伐至 10×7 公尺。

若栽植距離較寬，初期可間植蔬菜或木瓜等以增加收益，但是番茄與茄子必需避免，因番茄與茄子可能帶有一種輪生菌 *Verticillium*，酪梨對此很敏感。

摘芽整枝

酪梨在早期，為有較好的骨架，每一新梢長出時摘頂芽，以促進側枝生長。

樹冠內部有枯枝，或某些枝條妨礙灌溉及操作時，可除去之。

果園經一段時間，太密擠時，可除去部分枝條，讓陽光透過。

某些品種，枝條具直立性，必須去頂，以抑制其向上生長，但不要剪得太強，否則影響其產量。

除了上述各種場合外，一般以不整枝為原則。

雜草防治

酪梨的根系分佈很淺，80~90%皆在地面下 60 公



墨西哥系酪梨在二月中旬開花
分內，所以不宜用鋤或犁之方法除草。

對於較幼之樹，利用木頭刨片或稻草覆蓋在樹幹附近，可抑制雜草生長。

亦可用接觸性殺草劑如巴拉刈、油劑等噴射樹幹附近雜草，但噴前最好將樹幹包起，以免噴到，造成傷害。

根群外之雜草，可用殘效性殺草劑如草滅淨（Simazine）防治。


對於較大之樹，可用巴拉刈或草滅淨，除去樹幹或行間之雜草。草滅淨施用於土壤後，需噴水，以使藥劑產生作用，殺死萌發之雜草。

系統性藥劑如得拉本（Dalapon），不能用於已種酪梨之區域，用於未定植酪梨前之土地則可以，但仍需間隔一足夠時間後才定植，以免傷害酪梨。


一年後施肥

酪梨不能開溝施肥，宜離幹 20~50 公分均勻撒布，然後稍微灌水。


順光一心號 高性能稻穀乾燥機




SH38



SH32



SL18



BLP6B

*榮獲經濟部檢驗局評定甲等廠商
經濟部檢驗合格，享有中央補助

順光股份有限公司

TEL:(02)2606111~6(六線)
全省各地均設服務中心