

酪梨定植後第一年內一般不必施肥，如要施肥，氮肥及鉀肥必須最少分四次使用。

一年以後施肥時間，氮及鉀肥為1月、6月、10月。磷肥則在6月施用。

全年施肥量在南非，如表2所示。

關於微量元素之施用，氧化鋅每年施用一次，用量為200毫克，溶於100公斤水，噴洒於葉部。硼砂則每兩年施用一次，用量為100毫克溶於100公斤水中，噴洒於葉部。

表2：酪梨施肥量參考表

株齡(年)	肥料		
	氯化鉀 (61%)(克)	硫酸錳 (21%)(克)	過磷酸鈣 (18%)(克)
1	41.6	133.3	94.1
2	83.2	200	125.5
3	124.8	333.3	156.9
4~5	208.0	400	182.7
6~7	291.2	666.5	219.7
8~9	457.6	798.8	251.1
10~12	582.4	999.75	345.2

環狀剝皮

環狀剝皮在某些品種可成功地增加產量及減少隔



酪梨種子發芽

年結果。

剝皮時勿傷及形成層。通常厚度2~12毫米。

剝皮之時間，通常在晚秋開花前。

遮陰／防風

定植後9~15個月（依生長勢而定），需在頂端及側邊方面遮陰，以免枝條日燒。可用銅架或木桿擡遮陰布或麻布袋。

在有強風的地區，宜設防風帶，以增進授粉，防止花朵損傷、果實掉落與擦傷及枝條折斷。象草可生長至3~4公尺，可保護幼樹。成熟的樹則需較高之防風樹，但要不帶根腐病的樹才可以。

滴水灌溉

灌溉在酪梨園管理上是最重要的一件事。

酪梨的根很需要氧氣，所以酪梨對於浸水極為敏感。另一方面，浸水狀態有利於根腐病之發生，可能

香菇・木耳・菌種

品種優良・信譽卓著

（產品註冊商標）

- (1)西德鏈鋸 (9)綠葉素液劑
- (2)引擎打洞機 (10)白蟻藥劑
- (3)高速種菌機 (11)松鼠藥劑
- (4)電動打洞機 (12)菇舍殺菌劑
- (5)香菇封口腊 (13)拜貢殺蟲劑
- (6)種菇段木 (14)日本採茶機
- (7)茶樹剪枝機 (15)花卉素液劑
- (8)香菇營養劑

新農化工廠有限公司

台北市木柵路1段14號
洽購電話：(02) 936-4205
郵政劃撥：0103447-6