

如何消毒稻種？

稻種經選種後，可任選下列1種方法進行消毒工作：

(1)預先浸水催芽的稻種，至萌芽時，即刻浸漬於50%「免賴得」可濕性粉劑、或40%「免賴地」可濕性粉劑、或50%「伏賜丁」可濕性粉劑 1,000倍液中 4~12小時，並時加攪動（或搖動），以提高藥效。

稻種消毒後即可播種，藥液調配後24小時內，可連續使用3次。

(2)稻種預先浸水催芽，至萌芽時，浸漬於80%「多得淨」可濕性粉劑 800倍液中 6~12小時，並時加攪拌，以提高藥效。

稻種消毒後不必水洗，陰乾後即可播種。

(3)稻種浸漬於30%「佈生」乳劑 1,000倍液 6小時，並時加攪拌。消毒後須再浸水催芽，藥液可連續使用2次。

(4)將塑膠布舖在平坦地上，然

後將稻種勻舖其上，隨即將30%「佈生」乳劑60倍稀釋液均勻撒布，充分攪拌。每 100公斤稻種用藥量 110CC。

消毒後放置 2 天以上，再浸水催芽。

(5)稻種預先浸水 4 小時後，浸漬於25%「撲克拉」乳劑 2,000倍液中，並時予攪動，消毒後直接浸種催芽。藥液可再使用 1 次。

(6)稻種預先浸水催芽，至萌芽時，浸漬於80%「四氣丹」可濕性粉劑800 倍液中 6 小時，並時加攪拌，以提高藥效。藥液限用 1 次。

本劑對某些人有過敏性，勿使藥液觸及皮膚。

(7)稻種預先浸水催芽，浸漬於 41.8%「腐絕」水懸粉，或40%「腐絕」可濕性粉劑 2,000倍液中 1~6 小時，消毒後即可播種。藥液可以連續使用 2 次。



棉子粕

長年
有機質肥料



改良土壤 肥効長久

含有成分：
氮 4.5-5.5%
磷 2.5-3.0%
鉀 1.5-2.0%
有機物 87%

適應作物：
蘋果、梨、葡萄、柑桔、
菸草、茶葉、枇杷、蘆筍、
番石榴、蓮霧、木瓜、草蓴、
甘蔗、番茄、蔬菜、豆類、
花卉、盆栽

頂新製油實業股份有限公司
榮譽出品

彰化縣永靖鄉永靖街60號

(048) 2 2 1 1 6 6 (代表)

台北電話 (02) 561 3909

581 3907