

溫度、濕度及土壤肥分 均影响發病

在溫度 19~26°C、濕度70~90%時，發病非常猖獗，尤其是在有風、有雨和露水多的季節裏更為嚴重。桃樹若生長在通氣良好的砂土或砂壤土中，桃細菌性穿孔病易發生；氮肥過量而鉀的含量低時，或鈣減少而鉀增多時，桃樹也易感染本病。

選種無病苗木 剪除病枝注意噴藥

防治方法如下：

- (1)選擇無病苗木。
- (2)避免種植在其他寄主植物的附近。
- (3)平時應注意果園的除草、驅蟲、適當施用肥料等，春、冬季修剪病枝條，並燒毀丟棄。
- (4)以80%「大生45」400倍或80%「大富丹」800倍，在採果後、冬季修剪後、開花1周前、落花後各撒布1次，以後每隔半個月1次，連續使用至採果前半個月止，可減少葉片上的病斑數。
- (5)發病嚴重區，應有防風設備如種植防風林等。

冬季蓮霧防鳥害 套袋法最可靠

冬季（早花）蓮霧病虫害少，但鳥害特別嚴重。這是因為本省中、北部各種鳥類遷移南部避寒，適逢田間各類穀物收穫殆盡，又無其他水果可供食用，當然集中為害好吃又漂亮的蓮霧了。

鳥一波一波來，真是防不勝防，殺不勝殺，令果農深感頭痛。利用網、爆竹或藥劑毒殺，初期有效，但1、2天後便漸失效，據說「音頻」驅逐法用久了，同樣也無效。

目前還是以費工又費錢的「套袋法」，最為可靠。如再同時配合網捉（網宜常換位置）、放炮竹及毒殺，效果更好。（王德男）



苗栗縣特產 蠶絲被

100%純

輕舒柔
鬆適軟
!!!

貨真價實
寒冬的寵物
蠶絲蓋在身
溫暖透全心



苗栗縣農會蠶光牌蠶絲被價格表

每床	各種蠶絲被價格	
	特級品(元)	次級品(元)
1.0公斤	2.500	
1.5公斤	3.600	
2.0公斤	4.700	3.600
2.5公斤	5.700	4.300
3.0公斤	6.500	4.800
3.5公斤	7.500	5.500
4.0公斤	8.500	6.000
4.5公斤	9.500	6.700
5.0公斤	10.300	7.200

苗栗縣農會榮譽出品 來函或電話訂購即寄府上
訂購電話：苗栗縣農會大湖蠶絲廠
(037) 991021 · 322131

(1)雙人6·7尺·單人5·7尺
(2)1~2.5公斤春夏用
3~5公斤冬用