

殺蟲劑對二點小綠浮塵子具極高殺傷力，使浮塵子不致成災。

在菜農心目中，薊馬才是第一大害蟲，因許多藥劑對薊馬並無佳效，且其繁殖快速，迫使施藥次數不斷增加。據了解，茄子病蟲害防治費用中，半數以上都針對薊馬的防治，可見薊馬對茄子危害的嚴重性。

茄子的花器、幼果、葉片、葉柄及莖部等各部位均可被薊馬為害。但茄子被害狀與瓜類略有不同，茄子各部位被害以花器被害後可致凋萎而不結果，及幼小瓜果被害，瓜果長大後會在果皮殘留白色條狀食痕，重者果實彎曲或成畸形，而影響品質。其他部位被害主要減弱茄株生長勢，瓜果變小，影響品質與產量，當葉片受害後在葉片或葉背會成褐色，若同時發生葉蟻，加速葉片黃化和提早落葉，縮短生產期。

### 季節及雨量 支配棲羣消長

薊馬一年四季都會發生，據本場在民國69~70年調查，年中棲羣消長主要受季節、雨量因素所支配。屏東地區以3~4月、6~8月及12月薊馬棲羣較高，1~2月、5月、9月及10~11月密度較低。南部地區瓜類以5~6月及11~12月間密度最高，雨季8~9月間密度最低。台中地區以4~5月及11~12月乾旱季節密度最高，而6~9月為雨季，因長期下雨或豪雨的影響，幼蟲大量死亡，棲羣急速下降。

(未完・下期續)

按照農藥標示說明使用，可確保防治效果，並避免殘毒發生。

農作物病蟲害防治，1種病蟲，只要選用1種農藥，不必混用多種農藥。

台湾省政府林務處



# 彩色 實用食譜大贈送

**丁標梅雜誌一年(12期)650元**