

防治“薊馬”最新藥劑

美國FMC公司繼「好年冬」農藥後最新發明之專利藥劑

新好年丹[®]

48.34%
乳劑


中華民國發明專利15年

經濟部中央標準局專利證書號碼第11356號

R係註冊商標證號碼第132819號與第150722號

FMC[®] Marshal[®]

低毒！
安全！



新好年丹 48.34% 乳劑

政府推廣於下列作物防治薊馬之使用方法



作物	害蟲	每公頃用量	稀釋倍數	施用方法及注意事項
西瓜	綠色薊馬	0.4-1.0公升/公頃(天) (1500倍)		1. 於薊馬開始發生時即行噴藥，每週噴藥一次，連續 不得超過四次。 2. 採收前五天停止用藥。
芒果	薊馬	1.0-2.0公升/公頃(天) (1000倍)		1. 在開花後每隔10天噴藥一次，連續五天以上。 2. 採收前五天內停止用藥。
柑桔	薊馬	1.0-2.0公升/公頃(天) (1000倍)		1. 於花謝後幼果期內施藥。 2. 2. 採收前五天停止用藥。
鳳梨	薊馬	0.2-0.5公升/公頃(天) (1500倍)		1. 於薊馬發生時每隔7天噴藥一次，連續一次。 2. 採收前五天停止用藥。
葡萄	薊馬	150公升/株稀釋液 (1200倍)		於葡萄摘出前增加30分，大約在每出現第二、三天時， 在葡萄頂部及葉、葉柄等處噴藥，用射水機噴藥， 在特製射藥器噴藥，長後於每100株裝半自動噴霧器上， 噴藥時，斜上注入花叢內、幼果及中心部位。每個花叢 注入稀釋藥液150公升(大約5株鐘)，施藥後即可。



正豐

化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路70號
電話：(04)3393201-3



台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造商：FMC Corporation
Agricultural Chemical Division