

防治“薊馬”最新藥劑

美國FMC公司繼「好年冬」農藥後最新發明之專利藥劑


# 新好年丹<sup>®</sup>

48.34%  
乳劑

中華民國發明專利15年 經濟部中央標準局專利證號第11356號  
R 保註冊商標證號第132819號與第150722號

**FMC<sup>®</sup> Marshal<sup>®</sup>**

低毒！  
安全！



新好年丹 48.34% 乳劑

政府推廣於下列作物防治薊馬之使用方法

作物	害蟲	每公頃用量	稀釋倍數	施用方法及注意事項
西瓜	淡色薊馬	0.6-1.25公升/公頃 (或1500倍)		1. 於薊馬開始發生時開始噴藥，每星期噴藥一次，連續噴藥三四次。 2. 採收前2天內停止用藥。
芒果	薊馬	1.5-2公升/公頃 (或1000倍)		1. 花謝後每隔3天噴藥一次，連續五天以上。 2. 採收前2天內停止用藥。
柑桔	薊馬	1-2公升/公頃 (或1000倍)		1. 於花謝後每隔3天噴藥一次。 2. 採收前2天內停止用藥。
鳳梨	乳白薊馬	0.2-0.5公升/公頃 (或1500倍)		1. 於薊馬發生時每隔7天噴藥一次，連續三次。 2. 採收前2天內停止用藥。
番茄	薊馬	150公升/株稀釋液	1000倍	於花苞抽出藥劑30公分，大約花苞出現第2-3天時，在花苞頂端刺處，以注射方法施藥，注射器具使用手槍持器注射針筒，裝接於10公升裝半自動式噴霧器長噴管上，對準注入花苞內，勿傷及中心部位，每個花苞注入稀釋藥液150公升(大約5株株)，施藥一次即可。



正豐

化學股份有限公司  
台中縣霧峰鄉民生路700號  
電話：(04) 3393201-3



台灣總代理：國際技術股份有限公司  
國外製造廠：FMC Corporation  
Agricultural Chemical Division