

(3)甘蔗生育期及雨季之影响：爲避免施灌糞尿液中生化需氧量、固形態、可溶性塩類及所含氮量影响甘蔗生育及成熟，施灌與止灌時間均有一定限制，加上5～9月間雨季無法施灌，致施灌面積大受影响。

(4)農村對居住環境污染之重視：近年來民間生活水準提高，對於居住環境品質要求日高。台中廠番子寮農場，斗六廠清子農場，蒜頭廠東勢寮農場，仁德廠虎山農場，高雄廠東青埔農場等，畜殖場年產猪隻近9萬頭，輸灌工程面積有7百餘公頃。惟因鄰接民宅社區或靠近公路，爲免施灌時臭味引起民間抗議滋生困擾，致未能全面利用。

六・今後措施

(一)擴大輸灌面積

1.改善輸灌工程面積以提高利用率：各廠農場現雖有輸灌工程面積9,248.04公頃，惟各廠實際可供利用者僅8,403公頃，尚有工程面積845公頃需要加以改善，俾得以充份利用。

2.擴大輸灌工程面積：凡農場位於較偏遠地區而

尚有足夠面積可以容納糞尿施灌者，只要其工程投資報酬率够，將視財務情況分期辦理。

(二)研究放寬施灌期限：

1.研究提早起灌期限：各廠目前新植甘蔗於種植後3個月，宿根於採收後2個月開始施灌，惟据斗六廠山地粗質地土壤農場，於甘蔗採收後即施灌猪糞尿，結果，對宿根萌芽與生育，並無任何影响，故粗質地土壤蔗園開始施灌時間，尤其是宿根蔗園，將可提高施灌次數與效率。

2.研究放寬止灌期：目前各廠農場係於甘蔗收穫前6個月停止施灌猪糞尿，如照土地利用率75%計算，放寬1個月，即於收穫前5個月止灌，將可提高施灌面積至可施灌（每萬頭型每年施灌2百公頃）面積之82%，放寬2個月，將可完全達到可施灌面積，對糞尿之利用，將大爲提高。

(3)擴大猪糞尿分離與利用：台糖每萬頭型畜殖場每日約可生產新鮮猪糞6公噸，經分離處理後，据各畜殖場現場實測，其糞渣收集率爲28%，即每日可得糞渣1.68噸。糞渣可於堆積後運往較僻野無公害之貧瘠自營農場蔗田直接施用，亦可研究發展價格較高之厩肥。台糖畜研所利用分離後糞渣，發展花卉等高經

苗栗縣特產 蠶絲被

100%純

輕舒柔
鬆適軟
!!!

貨真價實
寒冬的寵物
蠶絲蓋在身
溫暖透全心



苗栗縣農會榮譽出品 來函或電話訂購即寄府上
訂購電話：苗栗縣農會大湖蠶絲廠
(037) 991021・322131

苗栗縣農會農光牌蠶絲被價格表

每床	10種蠶絲被價格表	特級(50%)	高級(50%)
1.00m	2,500		
1.50m	3,600		
2.00m	4,700	3,600	
2.50m	5,700	4,300	
3.00m	6,500	4,800	
3.50m	7,500	5,500	
4.00m	8,500	6,000	
4.50m	9,500	6,700	
5.00m	10,300	7,200	
型號：6・7・8・9・10・11 1・2・3・4・5・6・12 3・5・7・9・11			