

藥應噴及 棲息處所

蚜虫較喜歡棲息在幼葉背面，或嫩芽心處等較隱蔽的處所，因此施用藥劑時，應注意噴及棲息所在，才會有較佳的防治效果。

檢查植株 隨時滅除

此外，蚜虫的生殖速度很快，因此要時常檢查康乃馨植株，一有蚜虫發生，立即施藥，一般均需連續施藥至少2次，每次間隔7日左右，直至蚜虫消滅為止。

用新藥前 先行少量試噴

在開花季節的施藥，需留意藥劑對花瓣是否造成污斑等傷害，因各種不同康乃馨品系對藥劑的反應不盡相同，因此一般均建議在使用一種新藥之前，先以

少量的植株試施1次，如確定無藥害反應後，才大量噴施於全園的植株。

稻田福壽螺數量仍多 發現螺體請即防治

農林廳表示，根據農業試驗所最近調查資料顯示，屏東縣栽培冬季裡作紅豆的稻田，發現福壽螺存在量部分高達每平方公尺30~50隻之多，螺體在0.5~2公分之間。

此種大小的螺體，已具有為害秧苗的能力，農友應加強巡視田間，倘發現有螺體時必須立即防治，以免74年第1期作秧苗遭受嚴重為害。

防治福壽螺時，可按下列步驟辦理：

(1)引水整地前，於進出水口加裝阻隔網，防止灌溉溝渠中的螺體隨灌溉水流入為害。

(2)整地後保持3公分田水，先施用45%「三苯醋錫」等藥劑毒殺後，再行插秧。

苗栗縣特產 蠶絲被 100%純

輕舒柔
鬆適軟
!!!

貨真價實
寒冬的寵物
蠶絲蓋在身
溫暖透全心



苗栗縣農會農光牌蠶絲被價格表

每床	各種蠶絲被價格	
	特級品(元)	中級品(元)
1.0公床	2,500	
1.5公床	3,600	
2.0公床	4,700	3,600
2.5公床	5,700	4,300
3.0公床	6,900	4,800
3.5公床	7,500	5,500
4.0公床	8,500	6,000
4.5公床	9,500	6,700
5.0公床	10,300	7,200

(1)雙人6~7尺 • 單人5~7尺
(2)1~2.5公床為應用
3~5公床為用

苗栗縣農會榮譽出品 來函或電話訂購即寄府上

訂購電話：苗栗縣農會大湖蠶絲廠
(037) 991021 • 322131