

引進栽植

香林投引入本省，據筆者所知，可能要追溯到越戰期間。最初是由應聘工作於越南航空公司的我國飛機人員帶回栽植，越南淪陷後，筆者的國外友人也曾由星加坡及印尼引入。

香林投原產於熱帶，在本省平地栽植時，除北部地區冬季氣溫較低，須注意霜害問題外，其他地區都可種植。

繁殖更新

種植時，宜選擇陽光充足、排水良好的砂壤土。由於香林投植物不易開花結果，因此只能採用無性繁殖法繁殖。

繁殖時，選取着生於基部、生長良好，並已發生氣根的吸芽，直接植入土中即可。

種植時期以每年3、4月間，氣溫漸升時最為適宜。定植後將植株長到約50公分高，葉片25~30枚時，即可用小刀或枝剪採取靠近地面、較成熟的葉片，



圖1 鳳梨

風評越來越好！適合時代要求
省工最新稻熱病・白葉枯病特效藥

中日合資



三笠農藥

三笠 **好米得** 粒劑



- 葉、穗稻熱病，白葉枯病各施用一次，可得極佳藥效。
- 施藥簡便，吸收迅速，藥效持久(45天以上)。
- 施用一次好米得，勝過一般藥劑使用2~3次的效果。

台灣三笠化學工業股份有限公司

彰化市大竹里安溪西路39號
電話：(047) 38-2167(代表)