


瓦斯漏氣 不可立即開電器開關

朱開

瓦斯中毒的徵候，通常有心悸、頭暈、目眩、臉部發燙、吐氣等。稍加站立，則頭暈腦脹、四肢無力，甚至當場暈倒，有時就在平靜狀態下陷入昏睡。

使用瓦斯或換瓦斯筒、瓦斯接嘴時，正確的安裝及詳細的試驗檢查，常可減少不必要的災禍，鋼瓶鎖緊了，瓦斯雖然出不來，但任意打開爐火也往往會因疏忽而造成大



錯。

另一方面，加強瓦斯管的汰舊換新，避免瓦斯管的斷裂折曲，也可以減少意外的發生。

還有通風過於良好的廚房，得注意爐火被風吹熄，常導致瓦斯外洩。

發現瓦斯中毒，迅速以濕手帕掩口，打開門窗讓空氣流通，暫時停止呼吸，再將瓦斯開關栓緊。

千萬不可冒失闖入搶救，如此勢必造成無必要的傷亡。還有最要緊的是瓦斯洩漏時絕對不可開燈，否則會引發爆炸。

此外，一般瓦斯因為比重大，所以會下沉於地板上，此時若貿然

用風扇驅除瓦斯氣，反而有使它散佈的危險。

一氧化碳中毒患者，皮膚會發紅，顯得臉色紅潤，但這正是中毒的徵兆。發現中毒者，應先寬解中毒者的衣物，令他仰臥，遷往空氣流通處，再迅速送醫。

由於一氧化碳和血色素（運送氧氣的紅血球物質）的親和力很強烈，比氧氣和血色素的親和力強過210倍，所以會剝奪人血中的氧而使人中毒。

有時中毒過深，單只是氧氣急救也無濟於事。對於中毒病患不當的急救，常會導致病情延誤，不可不慎。

行政院衛生署最新出版

簡介食品製造與消費 150元

食品法規、食品香料、鮮味劑、甜味料、色素、防腐劑之使用，以及罐頭、冷凍、腌漬等之介紹。

衛生法規概要 600元

幼兒點心食譜 30元

適於幼稚園、托兒所及小學營養點心製作之參考。

幼兒營養衛生教育活動單元手冊(一) 30元

教導幼兒有關蔬菜、蛋、飲食習慣等題材，使幼童能從各種有趣的活動、實驗中，學習營養及衛生的知識。

幼兒教育人員營養及衛生基本手冊 30元

介紹營養、身體膳食、衛生保健等方面的知識，期能推動各幼稚園、托兒所營養及衛生的改善。

豐年社

台北市温州街14號
郵政劃撥0005930-0
每次郵購另加掛號郵資16元

最佳拍檔

100%大豆沙拉油 +
炒素什錦、佛跳牆
好吃！



純植物性不含膽固醇
大豆沙拉油



美國黃豆協會