

台東地區菊花的生產及利用


杜柏

菊花的學名是 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.。

台東地區菊花生產達 100公頃以上，主要集中於太麻里地區及台東市近郊。

栽培要點


栽培菊花，平常在12月間（11月下旬～12月中旬），採收菊花後，剪除地上部莖葉，畦上中耕除草，敷上一層堆肥，待2月間開始，由宿根部份萌出新苗，苗高達3～5吋，移入苗床假植，養足苗的元氣，5月間定植於本田。



白菊花經曬乾，可製茶菊。


Abion 系列產品從幼苗起開始保護您的作物

協養旺-C



高效能無毒展着保護劑。
適合各種作物之防寒、
防旱、抑制徒長、蒸散。

協養旺-CA



無毒土壤保護劑防止幼苗
立枯，解決連作障害，
維持作物健康。

Abion系列產品
都以原包裝進口
不在台灣分裝
請防假冒
認明真品

製造廠

日本アビオン化学研究所

台灣總代理

辰諭有限公司

台北市光復南路260巷52號2樓

TEL: 02-7310769-7813539

定植生長後須注意兩點：

1.打頂工作：所謂打頂，就是園藝上的摘心。摘心工作的目的，在於增加開花母枝，增加菊花產品。

2.分段施肥：因為摘心工作為增加分枝，前後要舉行4次，每次摘心都須有肥料支持，才能達到萌出新枝的目的。施肥的種類，在前半期使用台肥複合肥料1號，後半期則使用台肥複合肥料4號。

菊花每6.7~7公斤可晒成乾菊花一公斤，每公斤的乾菊花由農會收購時，白菊花為125元，黃菊花為135元。平均每公頃可生產乾菊花1,200~1,300公斤，每公頃可收15~16萬元；利益並不高，原因是工資占大多數。

幾種不同的加工方法

菊花因不同產地有不同加工方法，製成不同商品，這些商品名，有些代表地名，有些代表用途。同時對於黃色菊花與白色菊花的用途也有分別。

例如：菊花採收後，直接晒乾或烤乾，這種產品稱為茶菊，平常用於泡茶之用，習慣上，就常採用白菊花。

另一種加工則是代表地名，例如：菊花採收後，用蒸氣殺青3~5分鐘，然後乾燥的成品，慣行於杭州一帶，因此稱為杭菊。

此外，滁菊也是代表地區性。因為滁州產的菊花，常用硫磺燒成二氧化硫，然後燻蒸漂白，再搓成球狀後乾燥，因此稱之為滁菊。不過，在台灣生產的菊花，若經燻蒸、搓圓、乾燥，也叫滁菊。

毫菊也屬代表地區性加工法的一例。毫菊產於毫



菊花的植株形態

州，但收穫方式不同。即將菊花連枝葉一起收割，帶枝葉晒乾，乾燥後剪取菊花。此種加工法創始於亳州，但在台灣，一樣可以生產毫菊。

因此，這種商品名代表加工方式及品質的意義，實際上只不過是紀念創始地而已。



三要素
最均勻
有機質肥料

含有成分：
氮 4.5-5.5%
磷 2.5-3.0%
鉀 1.5-2.0%
有機物 87%

純正

棉子粕

頂新製油實業股份有限公司

榮譽出品

彰化縣永靖鄉永靖街60號

(048) 221166(代表)

台北電話(02) 5613909

5813907

改良土壤
肥効長久

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、
菸草、茶葉、枇杷、蘆筍、
番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、
甘蔗、番茄、蔬菜、豆類、
花卉、盆栽



採菊

用途廣泛

菊花性甘，味微苦、微寒，歸肺肝經。常用於疏風清熱，平肝明目等用途；一般習慣上，用於疏風清熱（治感冒）時，多取用黃菊花，使用於平肝明目（降肝火）時，多使用白菊花。

菊花的乾燥製品內，含有菊花苷、腺嘌呤、胆礆、水蘇礆、黃酮類等。經生物試驗結果，對於多種細菌均有抗菌力。例如：葡萄球菌、鏈球菌、痢疾杆菌、大腸桿菌、白喉桿菌、及流行性感胃病毒等均有抑

制生長作用。

野菊花也有解熱、降血壓效果，比白菊花、黃菊花為強，可惜台東地區尚未栽培。

推廣利用

目前稻田轉作，尋求農產品生產的多元化，以及農產品自行初級加工；菊花的生產，將是理想的作物之一。農民團體可以自己設立乾燥廠，生產加工茶菊、滁菊、亳菊、杭菊等，還可以吸收多餘農村勞力，給地方創造名產。

高級有機肥料

澳洲進口原料精製
不添加任何化學品
純天然動物有機質肥料
品質保證最優肥効持久
是普通有機質肥料3倍的功效



保 青

高級有機肥料

成份：天然氮 2.48%
天然磷 2.18%
天然鉀 9.43%
有機質 42.27%

經高溫殺菌處理，無惡臭，不易造成病蟲害。

適用作物：蔬菜、水果、花卉、國蘭、盆栽、苗圃、菸草、茶葉、草莓。

百縣化學股份有限公司
台北西忠孝東路1段11-2號3F
電話：(02)3917189-9398059

中區經銷處：043-393358
百醇維更分公司：039-893687
屏東經銷處：087-622329