

(4)在發病地不連作馬鈴薯。在山地、高冷地的旱作耕地更不要連作馬鈴薯，或不在短間隔期間，再栽培馬鈴薯。

(5)容易過濕的土壤，下雨時要注意排水。

(6)順天氣的變化，寒冷時少灌溉，或減少灌溉水量。

(7)提早拔除病株，減少肥料損失。黑痣病病徵，發病初期莖下方葉片，褪綠變黃，頂端小葉變小上捲，莖變紅紫色，節肥大。

(8)切薯前種薯粉衣50%「免賴得」可濕性粉劑或3%「維利黴素」，用量是薯重量的0.3%，種薯要乾燥粉衣。



黑痣病病株

由莖、葉、薯塊外觀 檢出病株

被害嚴重株：莖粗糙，頂部葉片變紅紫色，地際部莖附着白色粉狀物，葉柄與莖的角度變鈍角。


被害輕微株：採收薯塊表面附着菌核，一見即知黑痣病菌核。

植株在生長初期，主莖地下部位被虫咬傷，或被風吹傷，亦會阻碍養分的轉移，在葉腋生氣中薯塊，外觀雖類似黑痣病病徵，但地上部有所不同的地方是，葉片不向上捲。

施藥時注意風向，戴口罩，穿保護衣褲，避免身體受害。

台灣省政府農林廳

彩色 實用食譜大贈送



訂掃描綫雜誌一年(12期)650元
贈送：中視叢書「實用食譜」

或「鳳情千千萬」錄音帶
或「鄭少秋專輯」錄音帶
或「我是中國人」錄音帶
郵政劃撥〇〇一五五〇一—帳號·中視出版部
電話：七四一—〇七五九·七一—〇三一二