

防治薊馬、蚜蟲、褐飛蟲最新藥劑

美國FMC公司繼「好年冬」農藥後最新發明之專利藥劑

新好年丹[®]


48.34%
乳劑

中華民國發明專利15年 經濟部中央標準局專利證書號碼第11356號

(R)係註冊商標證號碼第132819號與第150722號

FMC[®] Marshal[®]

**低毒！
安全！**



新好年丹[®] 48.34% 乳劑

政府推廣於下列作物防治薊馬、蚜虫、褐飛蟲之使用方法

作物名稱	適用害蟲	每公頃每次用藥量	注 意 事 項
水 稻	褐 飛 蟲	1.2公升 / 公頃(次) (1000倍)	採收前10天停止用藥。
甘 藍	蚜 蟲	0.5~0.7公升 / 公頃(次) (1500倍)	1.每隔7天噴藥一次。 2.採收前9天內停止用藥。 3.僅適用於包菜葉類。 4.採收時剝去之外葉，不得使用，應予毀棄。
西 瓜	淡色薊馬	0.6~1.2公升 / 公頃(次) (1500倍)	1.於薊馬開始發生時即行噴藥，每週噴藥一次，連續不得超過四次。 2.採收前6天停止用藥。
芭 果	薊 馬	1.5~2公升 / 公頃(次) (1000倍)	1.花謝後每隔10天施藥一次，連續五次以上。 2.採收前21天內停止用藥。
柑 桔	薊 馬	1~2公升 / 公頃(次) (1000倍)	1.於花謝後幼果期內施藥二次。 2.採收前21天內停止用藥。
蘿 蔔	腹 薊 馬	0.2~0.5公升 / 公頃(次) (1500倍)	1.於薊馬發生時每隔7天噴藥一次，連續三次。 2.採收前25天停止用藥。
香 蕉	薊 馬	0.3公升 / 公頃(次) (1200倍)	於花苞吐出來轉綠時(約三天)，由花苞頂端基部以注射器注入稀釋液150~200公撮(約5秒)



正 豐

化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(04)3393201~3



台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造廠：**FMC Corporation**
Agricultural Chemical Division