



玉米栽植後，注意田間管理。（丘應權）

2月上旬～3月上旬播種，播種前先挖播種溝，深約6～7公分，行株距以75×20公分最適宜，穴播2粒，並於植溝內條施或距每1播種處約3公分的位置點施基肥，基肥肥料量每公頃硫銨280～350公斤，過磷酸石灰300～350公斤，氯化鉀50～75公斤，然後覆蓋種子、肥料，但覆土不宜超過6公分。

## 二・雜草防治

種子覆土後，2天內以43%「拉草」乳劑均勻噴洒上面，行萌芽前處理。

## 三・田間管理

1.間苗：在苗高15～20公分時進行，每穴留健苗1株，遇缺株時，前或後穴可留2株，以維持單位面積株數，確保產量。



手間除草

2.排水：幼苗若遇積水，易黃萎死亡，因此遇大雨時，應注意排水。

3.中耕、除草、培土、灌溉：生育期間應視雜草的生長情形除草，則苗高約30～40公分時行中耕、除草、培土，並行追肥，追肥量每公頃硫銨300～350公斤，氯化鉀50～75公斤。若無雨水，則在中耕、除草、培土前灌溉1次。

## 高級有機肥料

澳洲進口原料精製  
不添加任何化學品  
純天然動物有機質肥料  
品質保證最優肥效持久  
是普通有機質肥料3倍的功效



## 高級有機肥料

成份：  
天然氮 2.48%  
天然磷 2.18%  
天然鉀 9.43%  
有機質 42.27%

## 保青

經高温殺菌處理，無惡臭，不易造成病蟲害。

適用作物：蔬菜、水果、花卉、國蘭、盆栽、苗圃、菸草、茶葉、草莓。

百縣化學股份有限公司  
台北市忠孝東路1段11-2號3F

台北郵政9-393號信箱

電話：(02) 3917189-9398059