

4. 穗肥：雄花抽穗前，即開花前1~2星期，正值雌花分化期，在離每株根際約5~7公分處施穗肥，每公頃施硫銨280~350公斤，注意勿使肥料落於葉上，以免燒傷葉片。

5. 灌溉：雄花抽穗始前，及雌花吐絲期各灌溉1次；此2次灌溉對產量影響極大，但子粒成熟期間應保持土壤乾燥。

病蟲害防治

1. 夜盜蟲或切根蟲：播種前，可將3%「加保扶」（好年冬）粒劑均勻撒布於植溝內，每公頃30公斤。播種後若發現有葉部受食害或植株莖被切斷時，應噴洒35%「安殺番」乳劑1,000倍液。

2. 蝽蟲：抽穗、開花後或生育期間若發現蚜蟲危害，應噴洒90%「納乃得」（萬靈）可濕性粉劑3,000倍液或75%「歐殺松」可溶性粉劑1,500倍液。

3. 玉米螟：為玉米最嚴重的蟲害之一，生育初期，可施3%「加保扶」（好年冬）粒劑於心葉上，每株約1公克，抽穗開花後，發現螟蟲危害時，應噴50%「加保利」（賽文）可濕性粉劑500倍液。玉米穗蟲防治亦同。

4. 玉米煤紋病、銹病、葉斑病：一般用65%或80%「錳乃浦」可濕性粉劑400倍稀釋液噴酒防治。

5. 露菌病：以種子拌35%「滅達樂」可濕性粉劑防治，每公斤的種子用3公克的藥量，並加10c.c.的水拌種。



玉米銹病

收穫與調製

大約5月中旬~6月上旬時，果穗苞葉枯白，粒籽堅硬，用指甲壓而無汁液滲出時，為收穫適期。

收穫後剝去苞葉，充分乾燥至含水量13%，用脫粒機脫粒後，依規定裝袋，在農會通知的時間內運交並領貨款。

Abion系列產品從幼苗起開始保護您的作物

協養旺-C



高效能無毒展着保護劑。
適合各種作物之防寒、
防旱、抑制徒長、蒸散。

協養旺-CA



無毒土壤保護劑防止幼苗
立枯，解決連作障礙，
維持作物健康。

Abion系列產品
都以原包裝進口
不在台灣分裝
請防假冒
認明真品

製造廠

日本アビオン化学研究所

台灣總代理

辰諭有限公司

台北市光復南路260巷52號2樓

TEL:(02)7310769-7813539