

~2,000 尾，利用虱目魚的攝食來清除絲藻或人工撈除。

另一種處理方法，可以改變池蝦棲息環境，達到刺激草蝦脫殼的目的；一般採用的方法有提高水溫、大量換水，或施放茶粕刺激等。草蝦脫殼後，絲藻附着的困擾便可迎刃而解。

2. **外寄生原虫病**：由於水質惡變，又久不脫殼時，蝦殼或鰓瓣上，會附生一層白色棉絮狀的寄生蟲，被寄生的草蝦呼吸困難，嚴重者可能導致死亡；治療方法，仍以大量換水或施用茶粕刺激其脫殼，也可採用福馬林藥浴殺死原蟲。

3. **黑鰓病**：當池底形成嚴重的還元層時，由於污泥堆積於絲狀細菌間，而蝦的鰓外部、腹部及各步腳、游泳腳均受到感染而帶有黑色或黑斑，因而活力大減。患此症時，應即刻清池換水或早期施放底質改良劑，改善底質以爲預防。

4. **蝦體彎曲症**：此症是因在氣溫較高時，撈捕池蝦而發生的現象。因此撈捕時，宜選在氣溫較低時爲之，譬如在清晨或黃昏，當可減少或避免損失。

5. **變紅症**：患此病時，體呈紅色，活力減弱，攝食不良，有時體發惡臭。目前尚無治療方法，只有從平時注意水色，投飼新鮮餌料及改善底質着手。



圖4 文蛤收成後篩選(沈安麗)

另外，養殖期間爲害最烈的莫過於五鬚蝦，不但搶食餌料且羣體攻擊剛脫殼之草蝦，影響草蝦的生活空間，爲害甚巨。可用 0.004~0.007ppm 的「速松」毒殺，施用後，約經12小時以後，將會陸續死亡；惟使用農藥務須計算正確。

(未完·下期續)

和日春 鎂肥要素

和日春 純正蚶殼灰

和日春 超級紅苦土

改良酸性土壤

補充微量元素

促進土地肥力

改良品質·增加產量

提高糖分·香味

果樹

藥

魚物

效果!!

與衆不同

歡迎比較

和日春

中央標準局認定第88958號

和春化工有限公司

台中市西區忠明路56號

TEL:(04) 2515512·2514908

洋菇專用鈣

輕質碳酸鈣

說明書來函即寄

誠徵各縣市鄉鎮經銷商