



## 養蟬 可以下雜魚為餌

**問** 在印尼捕捉蟬的漁民很多，他們只知道捕捉，大的、小的、軟壳的、細小的都一律捕捉，很多不合出口商的要求，退貨出來，他們就以比市價便宜70%~80%賣出，像這樣的條件，是否適合我們買來再養殖？養多久才能收穫？(Jl. Kuantan No. 8 Medan, Sumut, Indonesia李國強)

**答** (1)養蟬池面積不宜過大，池堤建設須堅固，以防蟬鑽孔逃逸。堤防內側用2寸紅磚砌成斜坡狀，以便在池邊淺水處投餌。如遇池水缺氧時，可供蟬爬坡避難。如要節省經費，也可用斜坡的堤做為堤岸，再用浪板或石棉瓦片圍在四周，以防逃逸。只要靠近海邊，能引進新鮮海水做為池水，不需處理。

餌料使用最便宜的下雜魚，不必很新鮮，肉較多的比較合算。

(2)軟壳的蟬要細心照顧，不然會被殘食，細小的也可養，但要買真正的蟬苗。普通養約4個月就可出售。(陳勝香)



紅蟬(廖敏卿 攝)

## 無菌播種蘭苗 可用過錳酸鉀水消毒

**問** 無菌播種成活的胡蝶蘭，如何取出播種瓶？用什麼藥劑來防止幼苗感染細菌？(台南縣關廟鄉北勢村88號王坤寶)

**答** 無菌法播種成功的胡蝶蘭播種瓶苗，先打開瓶口，用粗鐵絲或筷子伸入瓶中，將培養基割成小塊，加入清水稍許，即可倒出。

如欲消毒，可將培養基連同小苗，倒入1,000倍過錳酸鉀液中，或「大生粉22、45、87」，或「達生粉」等農藥1,000倍液中，稍清洗，脫去培養基膠塊，移推入水苔鉢中，每鉢(3寸鉢)可種30~50株。

如苗木太小，不及1公分高，可再移入與播種培養基相同的播種瓶，等苗株大些再取出移栽水苔鉢中



胡蝶蘭(林果 攝)

。但第2次移入播種瓶之時，播種瓶及苗木均須消毒，瓶口並須用酒精擦抹消毒，所用用具亦須消毒，最好在無菌箱中進行。(董新堂)

## 椰子清琮 每年1次

**問** 我剛購置1甲多椰園，大概有250株。請問：  
(1)目前想補植椰苗，不知該種何品種？

(2)何時補植？何時施肥？施用何種肥料？如何施肥？

(3)如何清葉？多久1次？

(4)目前4年多了，開花很多而結果很少，這是什麼原因？如何防止？(台東縣大武鄉南興村3鄰7號)

## 民間互助會停標

雲林縣斗南鎮阿丹里德高4號李寶石先生問：

我參加一個互助會，兩個月標會1次，每會3萬元，會員共15名。現已標9會，得標的人均立有金錢借用証，且列明保證人。據會首說，其中有3個會員無法繼續付款，會首無力代繳，會首與活會會員協商不再開標，擬將死會會員應繳會款，按次收取分配給活會會員。結果拖延逾月，毫無效果。請問金錢借用証（連同保證人）是否有效？如何進行追償？

高瑞鈺律師答覆：

依最高法院49年台上字第1,635號判決所持見解，台灣互助會性質乃會員與會首間締結的契約，會員相互間不發生債權債務關係。申言之，遇有互助會發生停標時，活會會員基本上僅對會首有損害

## 法律問題解答

## 會首應負損害賠償之責

賠償請求權，對死會會員則無請求權。死會會員因標領得標會款，覓致保證人共同出具金錢借用証，也是死會會員為往後履行如期繳納各次會款，掣交會首的債權憑証，與其他會員不發生關係。

當然，會首如將持有的金錢借用証，交付與你，你並據以通知這個死會會員及其保證人，依民法第296條、297條，發生債權讓與的效力。你即繼受金錢借用証債權人的地位，得對這個死會會員進行訴訟法外或訴訟上的追償。

借用証時效期間15年，在此期間內，你可以隨時向他請求或向法院起訴。如果發覺對方有財產，為防止匿產，並得聲請法院裁定准予假扣押，藉資保全。

李良嬌)

**答** (1)因是補植，如原植者為高幹種，就應補植高幹種。若為早生種，則宜補植早生種。

(2)宜於春天或初夏補植。

如椰樹尚未達結實齡，可施用複合肥料(台肥1或2號)。如已達結實齡，應改用4或5號複合肥料。單株年施0.5公斤左右。施肥溝距幹1.5公尺，施肥後宜回填土壤。

(3)1年實施1次清琮(葉)。

(4)早生種需4~5年才開花結實，晚生種須7~8年。開始開花1~2年時，大部均為雄花。縱使着生少數雌花，亦因生理自然現象會形成早期落果，這是正常現象。往後只要注意管理如施肥、灌溉及病蟲的防治，自可有效防止落果。(劉正平)

## 土壤缺硼 會導致芒果裂果

**問** (1)芒果樹花開得很多，結的果實却非常少，請問如何能促進結果？

(2)芒果長到大拇指大時，會破裂腐爛。請問如何防治？(台中市南屯區文山里南巷3號賴慶森)

**答** (1)芒果華而不實的原因及防治法如下：

①營養不良所致。應於秋季(或果實採收後)多施有機質肥料，使新梢營養充足，發育良好。

②密植。須適當間伐，使樹冠生長成圓形，日照充足。

③適時防治病蟲害。

(2)芒果裂果腐爛的原因及防治法如下：

①如前述②及③項，疏伐可使空氣流通，減少病蟲害發生。適時防治病蟲害，就不會發生裂果腐爛。

②土壤缺硼也會發生裂果落果，應於每年春、秋季各施硼砂1次，每次每株施1湯匙量，如芒果已在開花結果，就必須以硼砂400倍液作葉面單獨噴布，約1~2次。(曾錫恩)



(阿郎 攝)