

2. **褐斑病**：在苗期及新栽植的幼株，較易感染此病。被感染部位以針葉為主，分枝次之，尤其在下雨及濃霧季節最易發生。被害部位呈現褐綠色針實狀小斑，而後漸擴大為暗褐色，周圍帶有黃色暈圈的病斑，最後轉為灰色，嚴重時會提早落葉。

防治方法：(1)割除的老莖應即燒毀。(2)清除雜草。(3)發病初期施用40%「腐絕」可濕性粉劑 2,000倍或80%「四氣丹」可濕性粉劑 800倍液防治。

3. **立枯病**：主要侵害蘆筍根部、根冠及莖基部，被害根部維管束呈現紅褐色壞疽病，地上部莖葉呈現黃化萎凋後枯死。

防治方法：(1)注意田間排水及選用具抗病性的品種。(2)嚴重發生時，應行輪作，改種其他作物，以避免更新時，再感染立枯病。

4. **回枯病**：莖枝部位無任何病斑，只在主莖上各分枝頂梢枯死。

防治方法：注意田間排水及選用具有抗病性的品種。

二・虫害防治

1. **斜紋夜盜虫**：俗稱黑土虫或行軍虫，幼虫以蘆

筍幼嫩部位為食，較老的幼虫則可食害葉部，被啃食的幼筍成彎曲狀。

防治方法：(1)為害時可用90%「納乃得」可濕性粉劑2,000倍或「達馬松」溶液1,000倍防治。(2)割除田間作植物，並清理畦間的殘株。

2. **薊馬**：成虫及若虫吸食蘆筍幼嫩部位植株的汁液，致使幼株無法正常生長或影响嫩莖的發育，葉部無法正常伸展，嚴重時植株變成矮叢如罹毒素病病狀。為害最嚴重季節在每年3~5月中旬及10~11月，大致上常在溫暖乾燥時期發生。

防治方法：用50%「達馬松」溶液 1,200倍以稀釋液防治。



日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號

立枯靈30%液劑

立枯靈的特長

1. 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2. 能促進根群發育，防止根部老化。
3. 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4. 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5. 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6. 無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

徹底消滅土壤病菌
培育健苗、必備良藥

* 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 *



台灣總代理
中國化學製藥股份有限公司
台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司
台北市敦化南路514號之3參樓
電話：7052414・7050155