



富有柿在嘉義結果情形



日本之設施園藝—柿之溫室栽培

核無85.7%，可選落果性少的品種。

2.氣候：開花期如逢陰雨，影响花器的發育，也影响授粉而致落花，在幼果期，逢久旱劇雨或土壤中水分急劇變化，均易造成離層細胞的活動而引起落果，所以此期應注意土壤水分管理，調節土壤適宜的乾濕度。

3.土質：在地下水水位高，過度潮濕之處，也容易發生落花落果，應改善排水。

4.行株距太小或果園太陰蔽通風日照不良，也造成落果，應改善整枝，修剪改善通風日照。

5.氮肥施用過量造成徒長或碳／氮率太低，也引起落果，可以環狀剝皮或斷根處理調節碳／氮率，但必須注意樹勢發育，其方法如下：

環狀剝皮：於4～5月間於樹幹韌皮部行螺旋狀的刻傷，寬1.5～2.0公厘，深以不傷及木質部為原則，可有效防止徒長造成的落果。

鐵絲束縛：於4～5月間以八號鐵絲在樹幹部束縛經1個月後再解開，可有效調節碳／氮率，防止落果。

親愛的農友兄弟：

在這講究好品質才有高價格的農業技術更新時代，你們所栽培的瓜、果樹、蔬菜、甘蔗、花卉、育苗、茶葉、菸草等農作物，如遇各種生理與土壤所引起發難不解之症狀，如何適當提高產量與改良品質等問題，請通知本公司為您提供服務。

一、施肥設計：適當的施肥避免過量所引起肥害、病害浪費金錢、勞力。市面上的有機肥料及無機要素、種類複雜、品質不穩定，各有優劣，建議您如何選擇理想產品。

二、土壤分析：無機肥料、重金屬要素施用不當產生土壤變質，如何恢復地力及連作所引起取構問題。

三、植物營養：要素不平衡所引起生理病變畸形果葉變色等，以上各種作物生長畸形、流花、落果、花芽、花苞、形成不良等診斷防治，歡迎農業專家提攜指導，協助克服本省土壤危機。

▼提供自配有機肥原料、要素、泥炭、炭化稻殼及其他有機原料

大益農有機股份有限公司技術服務部

台中縣大甲鎮中山路一段484巷8號

服務專線(042)八六三一八九·八七三三五九

益收寶

粒劑、乳劑

專治地下爬的線蟲、切根蟲、效果最佳，具有觸殺、胃毒及燻殺作用，使用方便、毒性低。

※使用方法請就教於本公司技術員或零售店

富農化學工業股份有限公司
台北市漢口街一段61號