

防治薊馬、蚜蟲、褐飛蟲最新藥劑

美國FMC公司繼「好年冬」農藥後最新發明之專利藥劑

新好年丹[®]


48.34%
乳劑

中華民國發明專利15年 經濟部中央標準局專利證書號碼第11356號

R. 係註冊商標證號碼第132819號與第150722號

FMC[®] Marshal[®]

**低毒！
安全！**



新好年丹[®] 48.34% 乳劑

政府推廣於下列作物防治薊馬、蚜虫、褐飛蟲之使用方法



作物名稱	適用害蟲	每公頃每次用藥量	注意事項
水稻	褐飛蟲	1.2公升/公頃(次) (1000倍)	採收前10天停止用藥。
甘蔗	褐飛蟲	0.5-0.7公升/公頃(次) (1500倍)	1. 每隔7天噴藥一次 2. 採收前9天內停止用藥 3. 僅適用於包裝葉類 4. 採收時割去之外葉，不得使用，應予燒棄。
西瓜	淡色薊馬	0.6-1.2公升/公頃(次) (1500倍)	1. 於薊馬開始發生時即行噴藥，每週噴藥一次，連續不得超過四次 2. 採收前6天停止用藥
芒果	薊馬	1.5-2公升/公頃(次) (1000倍)	1. 花謝後每隔10天施藥一次，連續五次以上 2. 採收前21天內停止用藥
柑桔	薊馬	1-2公升/公頃(次) (1000倍)	1. 於花落後幼果期內施藥一次 2. 採收前21天內停止用藥
蔬菜	蚜蟲	0.2-0.5公升/公頃(次) (1500倍)	1. 於蚜蟲發生時每隔7天噴藥一次，連續三次 2. 採收前25天停止用藥
香蕉	薊馬	0.3公升/公頃(次) (1200倍)	於花苞時出來傾斜5(約3天)，由花苞頂端與緣以注射器注入稀釋液150-200公厘(約5秒)



正豐

化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(04)3393201-3



台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造廠：**FMC Corporation**
Agricultural Chemical Division