

注意防治 減少發病

(1)栽培地的選擇：栽培甜椒或辣椒，以選擇未種植過易被感染作物的地區，且前作物為水稻的水田，可減少經由土壤傳染本菌的機會。

(2)築高畦，迅速排水並防雨後積水，本圃灌溉以量少次數多為宜，噴水式灌溉避免使用，如能選用清潔的地下水灌溉更好，用透明的屋頂防雨棚式栽培，亦可減低本病的傳染。

(3)藥劑防治可分苗床期及本圃。苗床期勵行苗床或育苗土消毒殺菌，在造好的苗床中間開深溝，以「必速滅」（又名邁隆）加水稀釋 150 倍，灌注於深溝中，再覆土，恢復原來的苗床狀。

如以育苗容器育苗，將稀釋的藥劑與育苗土均勻攪拌，再用塑膠布覆蓋畦面或育苗土表面，覆蓋時間 4~7 晝夜，視播種期緩急而定，然後移去塑膠布，育苗土可裝入容器，苗床用鋤頭鬆動畦面土壤，使藥劑加速逸去，如此操作，必須再過兩晝夜才能播種。「必速滅」除能殺除土壤中本病菌外，亦能殺死其他微生物及雜草種子。

如認為此藥劑使用不便，或不能等這麼長的消毒時間，也可選用「依得利」或「普拔克」，這兩種藥劑依照說明的使用倍數稀釋，用澆水器均勻灌注於播種後的畦面，苗期中另須再灌注此藥劑 1 次，可減少罹病機會，育成理想又健康的成苗。

本圃移植後的幼小植株也可用「依得利」或「普拔克」，依照說明的使用倍數及使用量，每株灌注，以達到防治地際莖部及根羣的甜椒疫病。灌注法對成株雖有效但不顯著，因成株根羣長，散布廣且深，少量的藥液難以涵蓋全部根羣。

莖、葉、花器及果實的疫病，可用「依得利」或「普拔克」的稀釋液，每 7~14 天噴施防治，雨後須再噴施 1 次。

(4)與不易被感染本病的作物輪作。

台中區農業改良場促請
農友在梅雨期間注意防治葡
萄露菌病，防治法在 63 頁中
介紹。

合信金庫
竭誠為您服務的銀行

請向全省合作金庫
及農漁會洽辦各項
農漁業貸款

農家綜合貸款
農業機械貸款
農家住宅貸款
漁船貸款
養殖漁業貸款

總庫·台北市館前路77號
電話·3118811(分轉各單位)