

用於防治菠菜露菌病，每公頃每次施藥量為 1.2~1.8 公斤，農藥稀釋倍數為 600 倍，發病初期開始施藥，以後每隔 7~10 天施藥 1 次，連續 3 次，使用時可加展着劑「全透力」1,000 倍噴施。採收前 18 天停止施藥，調配、稀釋及施藥時，應注意穿戴防護衣物，避免直接接觸藥劑。

### 香蕉黑星病新藥——普克利

25%「普克利」(Propiconazole) 乳劑是瑞士汽巴—嘉基 (Ciba-Geigy) 公司產品，吉康公司 (原永裕行) 申請委託田間試驗，純品為黃色粘性液體，廠牌名稱為 Tilt。

「普克利」為廣效的系統性殺菌劑。用於防治香蕉果實黑星病，農藥稀釋倍數為 1,000 倍，於抽穗後 7~10 天終蕾時，去蕾摘花並噴藥，然後套袋，每 1 果房使用稀釋液 50 C C。採收前 6 天停止施藥。

### 葡萄銹病新藥——貝芬普寧

75%「貝芬普寧」混合可濕性粉劑是台灣庵原公

司申請委託田間試驗，成品農藥為類白色粉末。

「貝芬普寧」為混合劑農藥，有效成分之 1 為「貝芬替」(Carbendazim) 含有 20%；另 1 有效成分為「滅普寧」(Mepronil) 含有 55%，農藥原體由日本組合會社 (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd) 供應。

用於防治葡萄銹病，每公頃每次施藥量為 0.8 公斤，農藥稀釋倍數為 1,500 倍，發病初期開始施藥，以後每隔 10 天施藥 1 次，連續 4 次，使用時可加展着劑「全透力」1,000 倍或「CS-7」3,000 倍。採收前 18 天停止用藥。

### 草莓果腐病與灰黴病新藥——免得克寧

70%「免得克寧」混合可濕性粉劑，是西德 BASF 公司產品，由正光公司申請委託田間試驗，成品農藥為黃色粉末，廠牌名稱為 Ronilan-M。

「免得克寧」是混合劑農藥，含有兩種有效成分，其 1 為「免得爛」(Metiram) 含 53.3%；另 1 有效成分為「免克寧」(Vinclozolin) 含 16.7%。


## 保護兼治療最佳「露菌病、疫病」藥劑

敬請指名購買

# 利露滅—鋅錳<sup>®</sup>

葡萄、瓜類、蔬菜—露菌病  
蕃茄、瓜類、青椒—疫病

● 滲透作用兼具移行性保護新稍 ●



### 敬告

原發明廠已於二年前  
淘汰不兼具保護作用  
之利露滅—銅在台  
發售，請農友多多採  
用比較優良的利露滅  
—鋅錳。

長效性  
增加收成



富農化學工業股份有限公司  
台北市漢口街一段 61 號

