

菸草腋芽抑制新藥——治芽素（甲）

85%「治芽素(甲)」乳劑，是美國 Emery Industries Ltd 產品，由富鉞實業公司申請委託田間試驗，成分為 Fatty alcohols (C₈—C₁₀)，廠牌名稱為 Emtrol。

「治芽素(甲)」是接觸性菸草腋芽抑制劑。用於抑制菸草腋芽的發生，每公頃每次施藥量為9公升，農藥稀釋倍數為50倍，菸草摘心後即將藥劑噴於莖頂，每株25CC，使沿莖頂流下，經7~10日後再施用21.7%「抑芽素(鉀鹽)」溶液50倍液，每株20CC，均勻噴於上部葉面。發蕾前避免施藥，以免發生藥害。

水田雜草新藥——必芬普拉草

4.2%「必芬普拉草」混合粒劑由富農公司申請委託田間試驗，成品農藥為灰白色粒狀，廠牌名稱為 Rifit-M。

「必芬普拉草」為混合劑農藥，含有「必芬諾」

(Bifenox) 2.5%；另1有效成分為「普拉草」(Pretilachlor) 1.7%，此種農藥原體由瑞士汽巴—嘉基(Ciba-Geigy)公司提供。為選擇性殺草劑，對於1年生雜草如「螢蘭」等防治效果良好。

用於防治水稻移植本田雜草，包括水稗、螢蘭、鴨舌草、母草、球花蒿草、紅骨草、瓜皮草、野茨菰。每公頃每次施藥量為30公斤，插秧後處理，第一期作插秧後2~4日施藥；第二期作插秧後1~3日施藥。積水期間3~5日。

農作物病虫害防治，1種病虫，只要選用1種農藥，不必混用多種農藥。

按照農藥標示說明使用，可確保防治效果，並避免殘毒發生。

台灣省政府農林廳



益收寶
粒劑、乳劑

專治地下爬的線蟲、切根蟲、效果最佳，具有觸殺、胃毒及燻殺作用，使用方便、毒性低。

※使用方法請就教於本公司技術員或零售店

富農化學工業股份有限公司
台北市漢口街一段61號

承包——
土木、水利
建築工程

大勝營造有限公司
許垂瑞
斗六市忠孝里大同路121巷8號