


## 加強整枝修剪

芒果在生育過程中，枝條發育極為旺盛，若任其自由生長，則會徒長，枝條過密，徒增病虫害防治上的困難，但大部份的果農却對整枝修剪的工作進行的不够徹底，少部份的果農則根本都沒有修剪，也未把握時期修剪。

芒果的修剪工作，應從幼齡時即應注意養成強壯及優良的結果架勢，即在定植成活後，於主幹離地面45~60公分處，在頂節下約5公分處剪斷，使它長出三枝左右的側芽，以後培養此側芽使它發育為側枝，再如法修剪即可。

成年芒果的修剪可依實際需要進行，第1次在幼果期，對已開花因故無果實的枝條經修剪，使它長出新梢，以便養成翌年的結果枝。另外需剪除無用的枝條，以利通風及噴藥。同時在果蒂上方的殘梗也應一併剪除，以防擦傷果實，影响外觀及品質。



第2次在果實採收期至採收後應馬上修剪，使新梢立即長出，以便養成翌年的結果枝，愈早修剪，愈能提早開花。此時對植株頂端的徒長枝可加以鋸除，以養成半圓形的樹冠，增進結果面積，同時使樹形矮化，便利管理工作。

第3次修剪可於11月花芽分化前修剪，此時宜將過密枝條徹底剪除，保持良好的通風及日照。

## 合理施肥

芒果果園普遍存在着植株衰弱，營養不良的現象，主要的原因為幼齡結果及不施肥。

愛文芒果在定植一年後即可開花結果，果農為求

保護兼治療最佳「露菌病、疫病」藥劑

敬請指名購買 **利露滅—鋅錳**<sup>®</sup>

葡萄、瓜類、蔬菜—**露菌病**  
蕃茄、瓜類、青椒—**疫病**  
● 滲透作用兼具移行性保護新梢 ●



### 敬告

原發明廠已於二年前  
淘汰不兼具保護作用  
之利露滅—銅在台  
發售，請農友多多採  
用比較優良的利露滅  
—鋅錳。

**長效性**  
**增加收成**



富農化學工業股份有限公司  
台北市漢口街一段61號