

——十式波爾多液(水 100公升配硫酸銅及石灰各1公斤)。

(1)5%撲克拉(包您好)乳劑2,500~3,000倍。

(2)50%依普同(樂富果)可濕性粉劑 1,000倍。

(3)70%腈硫脲(新雷丹)可濕性粉劑 1,000倍。

白粉病：發生於開花主幼果期，尤以濃霧的氣候最為適中，病狀如沾上白粉，防治藥劑如下任選一種：

(1)19.5%白粉克(可利生)可濕性粉劑1000倍。

(2)5%三泰芬(拜綠通)可濕性粉劑1000倍。

(3)25%布瑞莫(穩達達)乳劑4000倍。

(4)25%依瑞莫水懸粉1,500倍。

黑斑病：發生於果實肥大至成熟期，感染時，果實外表有星狀突出，可用十——十式波爾多液防治。此外在冬天植株樹幹有傷口時最易感染，會出現流膠的現象。

煤煙病：大部份由浮塵子、木蝨、蚜虫的排泄物所引起，只要使用殺虫劑趨除上述害虫即可防治。

葉蟬：年生約14世代，以陰涼、通風不良的環境最易發生，而以3月為最多，主要為害花穗及新梢，可以下列藥劑任選一種防治：

(1)40.64%加保扶(好年冬)水懸粉 800~1,200倍。

(2)90%納乃得(萬靈)可濕性粉劑 1,800倍。

(3)85%加保利(賽文)可濕性粉劑 1,700倍。

(4)30%撲芬松混合乳劑1000倍。

薊馬：發生於開花至幼果，主要為害花穗及幼果果蒂處或外表皮，產生粗糙的斑紋而影响品質。防治藥劑有：

(1)50%達馬松乳劑1000倍。

(2)2.8%第滅寧(大禧)乳劑1000倍。

(3)48.34%丁基加保扶乳劑1,000倍。

螟蛾(蛀心虫)及蚜虫可以防治葉蟬所使用的農藥一併防治。

以上病虫害的防治作業，應確實把握預防及治療時效，稀釋倍數應該準確，如可濕性粉劑不可隨意用湯匙搖，應用小秤稱，同時噴霧頭應以細霧狀噴出，使藥液能附着於植株為最理想。

芒果為一須細心照顧之果樹，尤以愛文品種為最，栽培者應明瞭其生育習性，自始至終做一妥善之管理才能有好的品質與成果，別忘了，流汗的耕耘就有喜悅的收穫。

RP RHÔNE-POULENC

益收寶

粒劑、乳劑

專治地下爬的線蟲、切根蟲、效果最佳，具有觸殺、胃毒及燻殺作用，使用方便、毒性低。

※使用方法請就教於本公司技術員或零售店

富農化學工業股份有限公司
台北市漢口街一段61號

敬愛的農友兄弟：
本公司為您提供各種果樹及其他農作物，如何適當處理提早收成，甜度着色不良，落花、落果、花芽、花苞等形成不良，如何提早花產期調節。敗壞敗根、土壤變質所引起之病變，提供健康栽培法等服務。

一、施肥設計
根據各地土壤條件，為各界代調配酵素、微生物綜合要素。植物性、動物性、天然礦物有機質，充份發酵天然有機肥。葉面補給專用。有利酵素(活菌)馬上好(胺基酸)利果肥，益農酵素原菌發酵分解專用，健根部、壯莖葉、利豐收等數十種系列產品，對症用藥，效果確實，敬請使用。

二、土壤分析
三、營養診斷

▲提供自配有機肥原料、要素、泥炭、炭化稻殼及其他有機原料

大益農有機股份有限公司技術服務部
台中縣大甲鎮中山路一段44巷8號
服務專線(04)八六三二八八九、八七二三五九