

防治薊馬、蚜蟲、褐飛蟲最新藥劑

美國FMC公司繼「好年冬」農藥後最新發明之專利農藥

# 新好年丹<sup>®</sup>


48.34%  
乳劑

中華民國發明專利15年 經濟部中央標準局專利證書號碼第11356號  
® 係註冊商標證號碼第132819號與第150722號

**FMC<sup>®</sup> Marshal<sup>®</sup>**

安全！

低毒！



## 新好年丹<sup>®</sup> 48.34% 乳劑

政府推廣於下列作物防治薊馬、蚜虫、褐飛蟲之使用方法



作物名稱	適用害蟲	每公頃每次用藥量	注 意 事 項
水 稻	褐 飛 蟲	1.2公升 / 公頃(次) (1000倍)	採收前10天停止用藥。
甘 藍	蚜 蟲	0.5 - 0.7公升 / 公頃(次) (1500倍)	1. 每隔7天噴藥一次。 4. 採收時割去之外葉， 2. 採收前9天內停止用藥。 不得使用，應予毀 3. 係適用於包葉菜類。 棄。
西 瓜	淡色薊馬	0.6 - 1.2公升 / 公頃(次) (1500倍)	1. 於薊馬開始發生時即行噴藥，每週噴藥一次，連續 不得超過四次。 2. 採收前6天停止用藥。
芒 果	薊 馬	1.5 - 2公升 / 公頃(次) (1000倍)	1. 花謝後每隔10天施藥一次，連續五次以上。 2. 採收前21天內停止用藥。
柑 桔	薊 馬	1 - 2公升 / 公頃(次) (1000倍)	1. 於花落後幼果期內施藥二次。 2. 採收前21天內停止用藥。
蔬 薺	腹 胸 薊 馬	0.2 - 0.5公升 / 公頃(次) (1500倍)	1. 於薊馬發生時每隔7天噴藥一次，連續三次。 2. 採收前25天停止用藥。
香 蕉	薊 馬	0.3公升 / 公頃(次) (1200倍)	於花苞吐出來傾斜時(約三天)，由花苞頂端穿 處以注射器注入稀釋液(50 - 200公撮(約5秒))



**正 豐**

化學股份有限公司  
台中縣霧峰鄉民生路700號  
電話：(04)3393201-3



台灣總代理：國際技術社股份有限公司  
國外製造廠：**FMC Corporation**  
Agricultural Chemical Division