

防治薊馬、蚜蟲、褐飛蟲最新藥劑

美國FMC公司繼「好年冬」農藥後最新發明之專利農藥

新好年丹[®]

48.34%
乳劑

中華民國發明專利15年 經濟部中央標準局專利證書號碼第11356號

係註冊商標證號碼第132819號與第150722號

FMC[®] Marshal[®]

安全！

低毒！

速效！



廣效！

■零售現金價

1000cc = 1400元

■請向正豐加盟店

購買



新好年丹[®] 48.34% 乳劑

政府推廣於下列作物防治薊馬、蚜虫、褐飛蟲之使用方法



作物名稱	適用害蟲	每公頃(每次)用藥量	注 意 事 項
水稻	褐飛蟲	1.2公升/公頃(次) (1000倍)	採收前10天停止用藥。
甘蔗	蚜蟲	0.5 - 0.7公升/公頃(次) (1500倍)	1. 每隔7天噴藥一次 2. 採收前9天內停止用藥 3. 僅適用於包葉葉類 4. 採收時割去之外葉, 不得使用, 應予毀棄。
西瓜	淡色薊馬	0.6 - 1.2公升/公頃(次) (1500倍)	1. 於薊馬開始發生時即行噴藥, 每週噴藥一次, 連續不得超過四次 2. 採收前6天停止用藥
蘋果	薊馬	1.5 - 2公升/公頃(次) (1000倍)	1. 花謝後每隔10天施藥一次, 連續五次以上 2. 採收前21天內停止用藥
柑桔	薊馬	1 - 2公升/公頃(次) (1000倍)	1. 於花後後約果期內施藥三次 2. 採收前21天內停止用藥
蘋果	腹薊馬	0.2 - 0.5公升/公頃(次) (1500倍)	1. 於薊馬發生時每隔7天噴藥一次, 連續三次 2. 採收前25天停止用藥
香蕉	薊馬	0.3公升/公頃(次) (2000倍)	於花苞時出來傾斜(約一天), 由花苞頂端與感以注射器注入稀釋液150 - 200公撮(約5秒)



正豐

化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(04)3393201-3



台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造廠：FMC Corporation
Agricultural Chemical Division