

害最烈。薊馬類每年5~7月及10~11月發生密度最高。成虫、若虫棲息心葉幼嫩部銼吸取食，造成心葉捲曲、變黑；待花位形成時，又轉而為害花器及幼果，造成畸形果或幼果上有物理銼傷疤痕。

實施清除園中雜草，可減少虫源。

3月及9月上旬 清除果園雜草

番荔枝於3~4月及9~10月萌芽時，薊馬即侵入為害，因此在3月上旬及9月上旬（剛萌芽前），

5月及10月上旬 檢視嫩心葉

5月上旬及10月上旬，檢視嫩心葉處，若發現平均10枚嫩心葉上，有薊馬達30~40隻時，或每1嫩心葉有被薊馬銼傷程度達25%時，及落花後結幼果2星期內，須各噴施2.8%「第滅寧」乳劑1,000倍液或48.34%「丁基加保扶」乳劑1,000倍液1次防治。

如何防治番荔枝紅蜘蛛與斑螟蛾

台東縣太麻里鄉大王村108號簡正遠農友來函詢問，番荔枝園中每年均遭受薊馬、紅蜘蛛及黑色的虫為害，不但枝葉受害，果實亦無法幸免，應如何防治？

(1)薊馬防治法，請參看第36~37頁。

(2)番荔枝葉蟎（紅蜘蛛）防治方法：

①秋末冬初乾旱時，葉蟎類極易發生，巡視果園，發現葉片沿葉脈有銹色斑點時，開始施藥1次。

②目前可用的藥劑有55%「殺蟎多」乳劑2,000倍或35%「大克蟎」800倍，任選1種防治。

(3)信中所提黑色幼虫即為番荔

枝斑螟蛾，防治方法如下：

①剪除果園中，有被番荔枝斑螟蛾寄生為害的果實，集中燒燬。剪掉的被害果實，不可直接棄置園內。

②5月下旬~6月上旬及10月下旬~11月上旬開始施藥防治，目前可用50%「撲滅松」乳劑1,000倍或90%「納乃得」3,000倍，將藥液噴於植株果實上1次。待中果時，約7月上旬及11月下旬再施藥

1次，8月上旬及12月下旬再施藥1次。採收前14天，停止用藥。（謝進來）



葉蟎為害造成黃化落葉

