

子宮內裝置避孕器

心梅

在國內，裝置「樂普」來實施避孕的婦女可說十分普遍，但有很多人說樂普會引起骨盆腔發炎，事實上，並不如一般人所說的那樣嚴重，也沒有具體的研究報告可以說明裝樂普和骨盆腔發炎有關。

我們知道，骨盆腔發炎是一種很普遍的婦女疾病，即使不裝樂普的婦女，也會發炎，如果把發炎的原因都歸究到裝置樂普上面，這種說法是有偏差的。

再說，所謂的「發炎」，一般人也有很多不同的說法。有人認為內分泌增多就是發炎，這是錯誤的，她們忽略了內分泌是有周期性的，時多時少，與裝置樂普實質上並無關連。此外，打荷爾蒙劑也會使內分泌增加。

少數婦女裝置樂普會使經血增多，但是情形並不很嚴重。如果是在落後國家，可能視為嚴重問題，因為這些國家的國民普遍營養不良，少數婦女裝置樂普後經血增多，容易造成貧血的現象。

至於有人認為裝置樂普會使經期不規則，有時延後，有時提前。

其實，月經的周期並沒有一定，提前或延後是正常現象，與裝置樂普無關。

也有人以為裝了樂普以後，容易造成腰酸、腹痛等現象，這種說法也沒有事實根據。

為什麼會有人說裝樂普和骨盆腔發炎有關呢？其原因不外乎下列三點：

- (1) 婦女個人衛生習慣不良所影響。
- (2) 婦女裝置樂普前，已有發炎、糜爛、白帶等現象而未予治療。
- (3) 裝置時，器械及樂普的消毒不完善。

醫師檢查

安全可靠

因此，婦女良好的個人衛生習慣是很重要的。更重要的是，樂普的裝置，一定要經醫師檢查後再作處理。

樂普的結構是以塑膠製成，其優點是不溶解，不會起化學作用，

也不會影響人體的內分泌。其合適的使用對象包括兩個先決條件，一是沒有明顯的發炎症狀，一是不適於使用其他方法避孕。

樂普的避孕失敗率，比較保守的統計是5%，也就是說，199個婦女裝置樂普1年，大約有5個避孕失敗。

如果以避孕效果來說，樂普的效果，顯然要比月經周期計算法、保險套來得高。

使用樂普避孕失敗而懷孕的婦女，如果懷孕後未取出樂普，通常小產的機會較多，而在懷孕後取出樂普，對胎兒本身也沒有不良影響，自然能和正常人一樣的生產。


裝置樂普

很少掉落

至於裝置樂普以後，在不自覺中掉落的情形也很少見，因為這種現象而造成懷孕的情形，大約每100個婦女裝置1年只有7、8個左右。

日本岡恒牌高級園藝工具

原裝進口，歡迎選購
請認清商標，謹防假冒。



刀身及紙盒無岡恒A級標誌者，均屬假冒品。若提供線索而破獲侵犯本公司商標者，當致薄酬。

鋼質最優秀！
設計最實用！

其他 洋蔥鋏 松葉鋏 植木鋏
梨軸切鋏(大曲) 刃物用油砥石

經銷處：新高貿易股份有限公司
台北市峨嵋街68號 電話：3314190·3713208
郵撥儲金台北市0015195—5