

，嚴重則成梢枯。於葉片上，只為害嫩葉，初為紅色小斑點，漸呈淡褐色圓形或不規則病斑，後期病斑部位會乾枯脫落，形成穿孔現象。

由雨水傳播

病斑上可產生許多孢子腔，然後釋出分生孢子，田間主要感染源為分生孢子，由雨水來傳播。田間發病的程度，因氣候是否適宜本病傳播而定，如遇連續下雨，溫度高均適宜本病的蔓延。病原孢子尚能在感病的枯枝敗葉上存活，而成為再次感染源。

感染後不易防治

本病由開花期至果實成熟，新枝及新葉形成，均會發生，期間相當長，且一旦病原菌侵入感染後，即不易治療去除，因此有效預防，才可避免發生。

9種藥劑

由開花初期起施用

開花期開始，可任選前頁表中1種藥劑來防治

本病。稀釋倍數、施藥時期及次數與注意事項等，均應遵照所示施用，不可任意更改。

生理落果後

即行套袋

至幼果形成期後（即生理落果後），利用防水良好的紙袋來套果。套果時，請注意封口應綁緊，以免雨水帶菌，由封口空隙滲入感染，即可有效防治本病，減少噴藥次數及費用，同時可避免果蠅產卵和其他害虫為害。

成熟果可用

溫湯處理

成熟果實炭疽病的防治，可把剛採下來的果實，浸在 55°C 溫水中 5~10 分鐘，然後放在通風良好的房中，或泡在自來水中約 2 小時，使冷卻至室溫的程度。但如處理不當，有時會造成果實表面臘層溶解，而使果皮失水成皺縮狀。



日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號

立枯靈30%液劑

立枯靈的特長

1. 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2. 能促進根群發育，防止根部老化。
3. 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4. 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5. 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6. 無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

* 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 *

徹底消滅土壤病菌
培育健苗、必備良藥



台灣總代理

中國化學製藥股份有限公司

台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司

台北市敦化南路514號之3參樓

電話：7052414・7050155