




大蒜枯葉 原因複雜

問

(1)大蒜葉子為何會黃掉？

(2)美國芹菜生育期間葉子為何會焦枯？


(3)蔬菜如何防颱風、防雨？(台中縣梨山和平路1段47號林榮元)

答

(1)大蒜在栽培期間發生枯葉原因為，日照不足，濕度過高（高冷地栽培），或發育初期溫度和濕度過高（平地栽培）時，均易引起枯葉現象。另外病虫害（如銹病、黑斑病、蟎類為害）也會引起枯葉。預防方法為，選擇日照充足，較通風，空氣乾燥，霧露易散之地栽培，同時注意肥培管理，如施肥、灌水、排水及防治病虫害。

(2)美國芹菜生育期間長，因此可能發生晚枯病，此病特徵為在葉片上有褐色病斑，擴展後結合使葉部乾枯，因孢子可隨降雨或水、風、昆蟲傳播，在冷涼及多濕季節發生最快。防治方法為，使用「鋅乃浦」可濕性粉劑400倍液，每周噴射1次。

(3)蔬菜園最簡易的防颱風雨方法為，在畦上或行間架設隧道式棚架，架上覆蓋塑膠布或紗網，遇風雨



屋前曬蒜頭（鮑國琛 攝）

時，塑膠布上再用繩子拉緊，如此就有良好的防颱風和雨及遮蔭效果，可仿照菸草育苗方法。此外利用高架塑膠網室效果也很好。（曾紹均）

注意施肥及灌排水 可減少米粒腹白

問

(1)台農67號水稻，可否多施鈣質肥料（純鈣）來減少腹白，或有其他解決方法？

(2)台農70號水稻是否較67號好管理、抗病虫害、米質好？(彰化縣田尾鄉溪頂20號陳敏楠)

答

(1)米粒腹白的多寡與品種、氣候環境及栽培方法皆有關，適量並適時施用氮肥，及注意後期生育的灌排水，勿使氮肥過量，及谷粒充實期間斷水太早，可減少台農67號米粒腹白的產生。

(2)台農70號可抗葉稻熱病、褐飛蝨，米質較台農67號略佳，但較易倒伏。一期作產量較台農67號略似，二期作略高，適合中南部地區栽培。（農試所農藝系稻作研究室）

水稻機械收割（楊文振 攝）



芒果隔年結果 早熟種少有

問

(1)如何防止芒果隔年結果？

(2)芒果是否可以噴第一磷酸鉀做為防止隔年結果的補助措施？施用法如何？(台南縣柳營鄉篤農村338號連進興)

答

(1)防止芒果隔年結果的辦法有：

①栽培早熟品種，②採取「芒果青」（如本地種），③加強肥培管理。

(2)第一磷酸鉀有助植物開花的功效，但在促進芒果開花結果的效果不彰，你可試用看看。

在芒果開花前2~3個月，噴布第一磷酸鉀3,000倍液，噴施3次即可。（曾錫恩）

已成年男女論及婚嫁

法律問題解答

仍以取得家長首肯爲宜

新竹縣芎林鄉新鳳村 3 鄰 3-1 號彭仁義先生問：

男 28 歲，女剛滿 20 歲，雙方情投意合，私訂終身。不料，男央媒說親，女方家長嚴詞拒絕，此事因而僵持不下。男女雙方自己想去法院辦理公証結婚，請問：

(1) 女方一滿 20 歲，是否即可辦理公証結婚？

(2) 女方家長如控告男方誘拐罪或其他罪名，是否成立？

高瑞鐸律師答覆：

男未滿 18 歲，女未滿 16 歲者，不得結婚。未成

年人結婚，應得法定代理人的同意（民法第 980、981 條）。換句話說，男女雙方如已成年，即可自己做主，逕自決定舉行公証結婚或其他形式的結婚。不過，按諸我國社會倫理，仍以能取得雙方家長首肯爲宜。

和誘或略誘未滿 20 歲的男女，脫離家庭或其他有監督權的人，依刑法第 240 條第 1 項、241 條第 1 項，應分別成立和誘或略誘罪。女方家長如有証據証明，其女兒於未滿 20 歲前，曾受男方和誘或略誘，在外同居，脫離女方家長監督權者，即應成立上述罪名。

南部種蘆筍 每年應有 2~3 個月休閒期

問

我參閱貴社出版的書籍「莖菜栽培」，在恒春鼻頭角附近栽植綠蘆筍。請問：

(1) 本地氣候溫和，冬季是否可生產？又落山風使母莖搖擺，會否影響產量？如何改善？

(2) 摘心會否影響產量？

(3) 是否有休眠期？如何分辨？

(4) 何時更新母莖？

(5) 缺肥時，可否以單邊施肥？條施、穴施何者較好？以耕耘機中耕單向施肥，會否影響產量及植株？可否施用殺草劑？

(6) 可否用旋轉噴頭葉面灌溉？（屏東縣恒春鎮大光里大光路 143 號蕭志雄）

答

(1) 在南台灣因冬季氣溫較高，可生產綠蘆筍。可用竹柱及拉塑膠帶來防止母莖搖擺，或在田邊做遮風，較有利於生產，否則會影響產量。

(2) 摘心不要太多就不影響，而以留 80~100 公分高的莖爲理想。

(3) 蘆筍在台灣南部沒有休眠期，只是爲了培育植株生育，必須在冬季給予 2~3 個月的休閒。如果冬季要採收，7~9 月應予休閒，以維持植株生長勢，利於採收。

(4) 母莖開始變黃，嫩莖長出少時，即爲更新之時。依你何時採收，做更新，並無一定限制。一般在台

灣是 7~8 月及 11~2 月不採收，其餘時間都可做更新採收。

(5) 可使用單邊施肥，以節省人力。但必須互換單邊施肥。條施、穴施均可，效果一樣。如用耕耘機做單邊施肥，只要交換單邊，即本次左邊，下次施右邊，如此並不影響產量及植株。不要用殺草劑。

(6) 可以。（陳榮五）

蓮霧施用第一磷酸鉀 可增加果實甜度

問

據說蓮霧園施用第一磷酸鉀，可以增加果實甜度，請問此說是否可靠？施用濃度及方法如何？（宜蘭縣員山鄉鄉民代表會劉永南）

答

在氮肥控制得當下，噴施第一磷酸鉀確可增加蓮霧果實糖（甜）度。使用方法及濃度爲，於吊鐘期至近紅頭期起，每 10~14 天噴 1 次第一磷酸鉀 1,000 倍，最好再加硫酸鎂 1,000 倍及硼砂 2,000 倍，效果更佳。（王德男）



（廖敏卿 攝）