

。發生部位以果實上最多，枝條次之，葉片上較少。沒有果實的時期，多寄生於枝條上。1年發生2~4世代。4月間就有新世代發生。雌成虫的產卵期可達數月，即雌虫的壽命相當長。

春天新孵化的若虫，從母體下爬出，遷移到新枝條及幼果上，這時是防治黃點介殼虫新世代最好的時期。不要等到果實上有許多黃點介殼虫，才行藥劑防治。雖然殺虫劑可殺死果實上虫體，但死亡後，仍緊附果皮上不會脫落，在此情況下，很多柑農以為農藥無效。被本虫寄生的果實，在果皮轉黃期被害果皮仍呈綠色，嚴重影响果實外觀及售價。

由於黃點介殼虫喜歡羣棲枝條上，冬季行整枝修剪時，一定要將寄生的枝條剪除乾淨，以減少田間密度。

採果後 徹底噴施夏油

12~2月間，收完果實，整枝修剪，並施用有機質肥料等基肥時，徹底噴1次95%「夏油」乳劑80~100倍，氣溫低時可採用80倍液。如刺粉蝨或介殼虫的密度高，可酌加「大滅松」或「滅大松」等殺虫劑。「夏油」會使新梢萎乾，一定要在春梢未萌發前噴施。「夏油」乳劑的稀釋液覆蓋虫體，使虫窒息死亡，所以要充分噴洒藥液到樹體各部位。


前述4種害虫，除了刺粉蝨會從遠處飛翔過來以外，黃點介殼虫、紅蜘蛛及銹蟬的傳播距離很有限，主要靠柑桔園內殘留虫體繁殖為害。如冬季的「夏油」防治徹底，春末初夏的害虫防治就輕鬆多了。

慎選藥劑 以免產生抗藥性

紅蜘蛛最容易產生抗藥性，不可連續使用同1種殺蟎劑。連用同1種殺虫劑多年後，害虫會產生抗藥性，施藥時，最好能記住這點，慎重選擇藥劑。

防治刺粉蝨及黃點介殼虫，可採用「大滅松」、「滅大松」、「福木松」、「加保扶」水懸粉、「得拉松」、「亞素靈」或「納乃得」。

同時可防治銹蟬及紅蜘蛛的藥劑種類是，「錫蟎丹」及「大克蟎」。可濕性硫黃粉劑300~600倍液，可有效防治銹蟬，夏天氣溫高時可採用600倍，以免發生藥害及影响樹勢。



彩色 實用食譜大贈送

訂掃描綫雜誌一年(12期) 650元
贈送：中視叢書「實用食譜」

或「鳳情千萬」錄音帶
或「鄭少秋專輯」錄音帶
或「我是中國人」錄音帶
郵政劃撥 〇〇一五四五〇一帳號 中視出版部
電話：七四一—〇七五九·七一—〇三二二