

右，即幼芽緊頂上箱的箱底時，移至秧田綠化。

4.灌溉及排水：粉碎谷殼較具吸水及保水，因此灌水吸濕後即行排水，如下霜現象或夜間積水時，翌晨也必須排水。

5.谷殼育苗應注意事項：

(1)谷殼育苗必須加以粉碎，粉碎程度以每吋20~24目為宜，粗谷殼操作不便，又保水力差，秧苗生長不齊，粉碎過細小也不適宜，因吸水後在堆積時容易產生高溫，輕者出芽不齊，重者灼死。

(2)谷殼粉碎後須篩除米糠，碎米以利吸水並防止發酵，高溫灼傷秧苗。

(3)粉碎谷殼用量每箱裝入厚度 1.5公分，重量約為420~450公克，並須採用塑膠箱育苗為宜。

(4)谷殼秧苗重量較土壤秧苗為輕，插秧時，須充分沾觸泥水，以增加重量來減少插秧缺株數均勻。

三。粉碎谷殼混合土壤育苗法

在沿海風力大地區及砂質土，若以純谷殼秧苗插秧、插秧灌水後秧苗受風吹動易浮起，引起缺株很多，影響產量，因此粉碎谷殼混合土壤育苗為宜，混合

育苗兼有土壤育苗及谷殼育苗的優點，育苗容易，目前為育苗中心普遍採行的育苗方法，其育苗管理方法與土壤育苗法相同，只有育苗床材料混合土壤、肥料用量等不同，茲說明如下：

1.苗床：粉碎谷殼 2份（每箱重約 320公克，每公頃77公斤）混合土壤 1份（每箱重量 820公克，每公頃 197公斤）即 2：1 容量比作為育苗材料，土壤用量連覆土每箱600公克，計總量221公斤，較土壤育苗用土840公斤節省三分之二，粉碎谷殼用量 77公斤，而全谷殼育苗 100公斤也可達到使用谷殼的目的。

2.肥料用量及施肥法：肥料與土壤、谷殼混合攪拌，每箱肥料量硫酸銨 6公克，過磷酸鈣 5公克，氮化鉀 3公克。

3.堆積：灌溉、排水同谷殼育苗法。

4.其他管理方法：與土壤育苗法相同。



農|業|化|學|品|及|資|材

蓖蔴粕(Castor Meal) 印度原裝進口，最優良之有機肥料。

益果農(Unizeon) 日本原裝進口，最佳土壤改良劑。

海藻精(海中肥® Seaweed Powder) 西德進口，最好的葉面施肥劑，效果最快。

優肥®(Micro nutrient) 綜合有機微量元素，補充各種微量元素。

化學試藥 L-TYROSIN、 α -NAA、SNA、 α -NA、IAA、IBA、勃激素、6-BA、B-NINE 4CPA

利果農(EKOLON) 日本進口，保護果粒，使果實更美，價值更高。

其他各種農業化學品 西德進口鉬酸鈉、磷酸-鉀、磷酸-鈣、日本進口鉬酸銨、美國進口硫酸錳、法國進口之E.D.T.A、鋅塩、錳塩、荷蘭進口E.D.T.A、鐵塩及鈉塩。

各種農業噴嘴 各型各式，不同作物之噴管、噴嘴。

棉子粕（草棉、木棉均可供應）

各種農業用化學品、機械等，報價、期貨及現貨供應。

六和化工股份有限公司

各種產品詳細資料，歡迎洽索

台北市中山北路三段47號7樓 TEL: (02) 5954321 (30線) 轉235吳副理 轉238左先生