

工廠阻塞農田排水溝

彰化縣埔心鄉瓦北村瑤鳳路1段249巷10號林清柳先生問：

我的農田旁邊，本有1條排水溝。後來因水溝另側土地，被一家公司買下，作為生產工廠，水溝橫遭阻塞，以致每逢下雨，附近農田宛如一片汪洋。

我的農田最靠近原有水溝，其他農民為了排水，大肆將我的田埂挖開，藉以宣洩積水，但因我的農田較低窪，如此我田中農作物，總要被浸泡多日，損失慘重。

所有農民集體向上陳情，工廠始終裝聾作啞，故意拖延。在此情形下，受損最大的我，可否拒絕其他農民將水排放到我的農田？如何阻止他們？

高瑞鏗律師答覆：

民法第 779條規定「高地所有人，因使浸水之

觸犯水利法

地乾涸，或排泄家用，農工業用之水，以至河渠或溝道，得使其水通過低地。

但應擇於低地損害最少之處所及方法為之。前項情形，高地所有人對於低地所受之損害，應支付償金。」

本件情形，如其他農民能有較佳的方法，排除積水，你就可以拒絕他們將水通過你的農田排放。當他們任意挖開你的田埂，甚至可告他們毀損罪責（刑法第354條）或損害賠償（民法第184條），否則，你只有容忍他們將高地的水，經由你的田地宣洩。不過，應請其他農民擇用損害最少的處所及方法為之，你並得請求他們支付償金。

不過，釜底抽薪的根本解決辦法，還是繼續向上級主管機關聲請責命工廠限期回復水溝原狀，必要時，且得移送法辦（水利法第92、93條參照）。

7 鄰153號翁建欽)

答 (1)油茶可以種子直播繁殖與育苗栽植，種子繁殖並不會使果實變小，但初期撫育不易，易發生缺株情形，因此以先育苗後栽植較佳。

(2) 9—10月種子採收後，先行浸種24小時，再條播入播種溝內，覆土3—4公分，並蓋上薄草。（張盛）

釋迦紋羽病 曝曬根部防治

問 (1)釋迦的樹幹長出了1層灰白，像是發霉的樣子，最後樹皮腐爛，至整棵枯死。請問是何病？如何防治？

(2)果實長至雞蛋大時，整個果實都變黑，像排泄物。請問是何病害？如何防治？（台東縣卑南鄉初鹿村84號林白吉）

答 (1)此病是紋羽病所引起，於樹幹地基部處最易感染，初期長出灰白菌絲，菌絲纏繞樹幹，最後長出如褐色菌核，整株枯死，有些農友稱為「立枯病」。

防治方法為，將地基部處土壤扒開，讓陽光直接曝曬病菌，再以80%「四氯丹」可濕性粉劑 400倍液

灌注於地基部。

(2)果實黑變原因有，物理刺傷、生理性缺微量元素或水分過多及病原菌等造成。

根據來信所述，是因74年度正期果碰上梅雨期，國曆5月下旬—6月上旬連續下雨，造成吸水過多，在變黑的果日上泄出水珠，最後整個果實黑變硬化。

防治方法為，於幼果期時，適當剪枝及疏果，避免枝葉過分茂密。另外因釋迦多栽植於砂礫坡地，排水應良好，避免雜草過分茂盛，使釋迦四周濕度大增。（謝進來）



（廖敏卿 攝）