


農村家庭 家事改進



預防幼兒隨意抓食 藥物應放適當位置

剛開始會走、會爬的小孩，正處於無知的年齡，老鼠藥、殺蟲劑往往成了他們抓食的對象，為父母者應小心防範，以避免發生小孩誤食毒物。

小孩的毒物中毒，五分之四發生在五歲以下，而以兩歲左右為最多。其中，85%屬於意外服食，另外15%，則是小孩故意服食。

一般造成小孩毒物中毒，多係家長疏於照顧，且將家中容易引起中毒的物品，擱置在小孩隨手可拾的地方。因此如清潔劑、香水、指甲油、油漆、內服藥物、除臭劑、殺蟲劑、老鼠藥、外用藥物、漂白劑等，都不宜放在小孩伸手可取的位置。

有些小孩喜歡將玩具放入口中，父母在選擇玩具時，應避免購買上面塗有鉛質的玩具，以防意外。

但有時小孩誤食毒物的事件，仍令人防不勝防，若小孩已不幸吞下或喝下有毒物品，為保全幼兒性命，應立即採取各種急救處理。

小孩吞下毒物後，應立刻強迫

他喝下一杯牛奶或食用生蛋白，以沖淡或中和胃中毒物，減少毒物被吸收。

用手指頭或茶匙伸入喉嚨給予刺激，使他吐出胃中的東西，並把臉部朝下，以免吐出的東西進入氣管，然後給予牛奶或水，以促使他嘔吐。

如果吞食的是強酸、強鹼或揮發性的液體、油類，或是根本不知

吞食了什麼東西，則不可催吐，應立即送醫治療。

如果發現已過了三、四小時，則應予瀉劑或灌腸，使毒物排出體外。

在經過初步處理後，仍應儘速送醫，最好將空瓶、空盒及小孩的嘔吐物、瀉物一起送醫，並查明小孩的服用量及服食時間，使醫師做緊急適當的處理。



在觀光葡萄園內享受全家溫馨的氣氛(張俊惠 攝)