



非農會會員 不能參加農民保險

問 我自國中畢業後，就與父親從事農業，但不是農會會員，可否參加農民保險？（宜蘭縣員山鄉內城路 223巷 7 號游火財）

答 依照農民健康保險暫行試辦要點規定，凡依農會法第12條規定，加入農會的會員始得參加農民健康保險。（徐靜田）

野苦苣 有軟化與非軟化型兩類

問 據報載最近農業單位由歐洲引進的野苦苣，已在台試種成功。請問野苦苣要如何栽培？種子何處購買？（台中縣新社鄉大南一村22號楊坤龍）

答 (1)野苦苣一般分軟化型與非軟化型兩類，是歐洲重要的生食蔬菜。軟化型需先培育地下根，大小如胡蘿蔔，再以地下根密集栽培於暗室內，促生黃白色葉筍供食用。而非軟化型地下根不肥大，僅地上部形成半捲形的苞葉，供做一般蔬菜。

(2)目前野苦苣在台灣尚未有栽培，農業改良單位



非軟化型的野苦苣(黃貴豪 攝)

正積極辦理試驗研究中。如有發現產品，當是國外進口。種子在市面上未有出售。（鄭婧）

雉雞產卵 5~6月最多

問 我與兩位朋友計畫養雉雞，請問多久才會產卵？生蛋期間多長？如何辨別好種？銷路如何？（彰化縣福興鄉沿海路 3 段205號粘志熙）

答 (1)雉雞通常飼養 1 年後，開始產卵，每窩產卵數 8~15 個，每年產卵數約 60~80 個，第 1 年產卵數較少，第 2 年最多，以後逐年降低。每年 4 月產蛋，南部地區比北部地區早產，至 8~9 月間停產，以 5~6 月產卵最多，孵化日數 24~25 天。

(2)選種以體格強健，性情柔順，沒有野性，容易管理，體態優美，體重平均公 2.5 公斤，母 1 公斤的改良種較好，通常公 1.5 公斤、母 0.8 公斤均當肉用雉出售。



台灣雉雞(呂福和攝)

(3)雉雞肉冷凍外銷日本，國內銷售對象為山產店、土雞城。雄雉肌肉結實，雌雉肌肉柔嫩鮮美，宜蘭、台東地區分布多。最近因受經濟不景氣影響，雉雞肉及羽藝品外銷市場有限。（唐清芬）

注意氣候突變 減少小鴨咳嗽

問 我飼養的土番鴨，常在 5、6 天到 14 天，這段期間有類似咳嗽的症狀發生。請問：

- (1)這屬於那 1 種病態？
- (2)有何方法治療？
- (3)以後如何管理，才能避免發生？
- (4)如欲促進成鴨的羽毛生長良好，須給何種物質？（高雄縣旗山鎮中正里中興街 4~1 號黃榮富）

私有的道路預定地

雲林縣虎尾郵局59號信箱鄭老問：
土地法第14條明定：公共交通道路，不得為私有。我和別人共有兩筆土地，為道路用地，可否要求國有財產局或其他有關單位收購？如何辦理？其他有何方法，消滅土地所有權？

高瑞鈺律師答覆：

公共交通道路，不得為私有，但私有土地，非不得成為公共交通道路。私有土地，經都市計畫編定為道路用地者，事所恆有。依土地法第14條第2



未闢建前—— 不能要求政府徵收

項，第208條公共道路用地為私有者，得由政府徵收。有關徵收程序，詳如土地法第222~247條。

但本件情形，雖經編定為道路用途，但政府尚未列入年度計畫，決定使用該地闢建或拓寬道路，似不可能要求政府予以徵收。

你如不願長此懸置，可將是項土地權利，具函向國有財產局聲請捐贈為國有。如經國有財產局轉呈財政部同意受贈，即得辦理移轉國有登記，以喪失你土地所有權。

答 (1)咳嗽症狀為呼吸道感染傳染性漿膜炎所引起的。

(2)可在飼料或飲水中添加 Sulfamezathine, Lincomycin 或 Flumequine 予以治療。

(3)兩周齡以內的小鴨，應注意氣候冷熱突變所造成的緊迫，並避免腳底破損，減少感染機會。

(4)促進成鴨羽毛生長，應補充維生素與礦物質，並須要有足夠的氨基酸，其中尤以 Methionine 及鋅必須足夠。(劉瑞生)

木耳白黴病 濕度高時易發生

問 栽培木耳，為何其上會附白粉？(宜蘭縣冬山鄉中山村 126號江勇)

答 從信中敘述判定是1種絲狀菌所感染，俗稱白黴病，即在本身子實體上附有白粉。一般農友於晒乾前或出售前，均經洗滌過。

此病於濕度高時，較易發生，尤其春末夏初梅雨季節最普遍，應注意通風，保持良好環境衛生，可減少發生。(謝能)

高接梨人工授粉 花粉應先採取冷藏

問 高接梨如何做人工授粉？(台中縣東勢鎮泰昌里東崎街 385~18號陳盈晴)

答 高接梨人工授粉方法如下：

(1)利用梨山地區修剪枝帶回冷藏於 2~4°C，在預定開花前2星期取出，插植在水中並用塑膠布保溫，溫度控制在20~25°C之間(如超過30°C以上時，花粉發芽率低)，以促進開花。

(2)採取花粉用的花蕾，應於花瓣張開前最佳，可避開花後花粉飛散。

(3)花蕾採取後，平放白紙上，放置於25°C的恆溫箱中，30°C以上開藥早，花粉呼吸作用大，養分消耗多，發芽率及貯藏性低。開藥時的濕度，應保持在30~50%較適當。

(4)花蕾採取量每10公畝(1分地)約需1,000~1,500朵花蕾，約可收集1~2公克。

(5)花粉收集後，用紙包好，放入密閉容器中，在3~5°C冷藏庫中保存。使用時，可用石松子10倍以下增量劑混合，均勻塗布柱頭。(林嘉興)



梨花(阿郎 攝)