

執行。

①第1次施藥：萌芽前1周，噴撒下列任1種藥劑。

39%「四氯丹」水懸粉500倍

12.27%「芬瑞莫」乳劑或可濕性粉劑4,000倍

25%「撲克拉」乳劑2,500倍

65%「多寧」可濕性粉劑2,000倍

70%「甲基鋅乃浦」可濕性粉劑500倍

80%「四氯丹」可濕性粉劑800倍。

②第2次施藥：花落 $\frac{3}{4}$ 時，藥劑種類同上，任選1種，但「多寧」應用2,500倍，以免傷及幼果。

③第3次施藥：第2次施藥後7~10天噴撒，藥劑種類及使用倍數同上。

④第4次以後，應每隔10天1次，若陰雨多時，施藥次數應增加，至8月中旬停止施藥。

⑤5~6月間的防治最為重要，千萬不可忽略。若延誤1次施藥，即不能抑制黑星病的發生。病害已經發生，即不易挽回。

⑥各藥劑必須交替輪流使用，不可連續使用同1種藥劑，否則易產生抗藥性。系統性殺菌劑更不可連續使用。



葉片及
枝條上的病徵

農|業|化|學|品|及|資|材

蓖麻粕(Castor Meal) 印度原裝進口，最優良之有機肥料。

益果農(Unizeon) 日本原裝進口，最佳土壤改良劑。

海藻精(海中肥® Seaweed Powder) 西德進口，最好的葉面施肥劑，效果最快。

優肥®(Micro nutrient) 綜合有機微量元素，補充各種微量元素。

化學試藥 L-TYROSIN、 α -NAA、SNA、 α -NA、IAA、IBA、勃激素、6-BA、B-NINE 4CPA

利果農(EKOLON) 日本進口，保護果粒，使果實更美，價值更高。

其他各種農業化學品 西德進口鉬酸鈉、磷酸-鉀、磷酸-鈣、日本進口鉬酸鉍、美國進口硫酸錳、法國進口之E.D.T.A、鋅塩、錳塩、荷蘭進口E.D.T.A、鐵塩及鈉塩。

各種農業噴嘴 各型各式，不同作物之噴管、噴嘴。

棉子粕 (草棉、木棉均可供應)

各種農業用化學品、機械等，報價、期貨及現貨供應。

六和化工股份有限公司

各種產品詳細資料，歡迎洽索

台北市中山北路三段47號7樓 TEL: (02) 5954321 (30線) 轉235吳副理 轉238左先生