



蒸散抑制劑噴施在植株上的情形

劑，噴洒在葉部可解決上述的摘葉缺失。本省草莓的盛產期在1～3月間，4月雖然仍可生產，但因氣溫已高至25°C以上，果實品質不佳，又匍匐莖均已生長發達，非適當的生長月份；在南部則以2～3月間為盛產期，但一般在2月上、中旬以後（農曆新年過後），由於溫度開始回升，草莓生長旺盛，而影響開花結果，因此，使用5%的蒸散抑制劑稀釋液，必須於草莓栽植後3個月（約1月中旬左右）開始噴施第1次，以後隔6星期再噴施1次。

噴施次數的多寡，依植株生長勢的需要而定，大約全期噴施2～3次，所得到的結果，可抑制植株葉片數增加，以及減少匍匐莖的生長，使草莓開花結果在採收中期後，仍然不受影響。又因噴施蒸散抑制劑後，可減少匍匐莖的生長及抑制植株葉片數增加，因而可免除經常摘葉的困擾。

增產且病虫害減少

致於在產量方面，可較摘葉處理高出10%左右。由於蒸散抑制劑噴施在葉部上，並未蓋住所有的氣孔（一般約 $\frac{1}{2}$ 左右），所以對光合作用的影響不大，因此也不影響草莓的糖度（測定果實糖度結果，並無差異）。又噴施蒸散抑制劑後，可減少病虫害的發生，尤其對紅蜘蛛的防治效果特別顯著。

應視生長情形施用

是否每一草莓園都可利用蒸散抑制劑或以摘葉處理來抑制生長而達到生產的目的呢？那不是的，應該先了解你那塊草莓園的草莓生長狀況而定，如果生長旺盛，才可使用上述兩種方法來處理，如果生長不旺盛則免了；絕對不要看到別人家的草莓園摘葉，或利用蒸散抑制劑噴施來抑制生長，就跟着別人做，這樣一來，反而得不償失。

矮脚晚生

新品系檳榔苗售



本品系檳榔收成期比高脚檳榔慢三個月，盛產期集中在農曆元月到四月，每株收成高達千元，歡迎前來參觀母樹。

北斗鎮七星組神農路16號(048) 870007
神農種苗園謝文裕洽