


農村家庭 家事改進



及早發覺 寶寶聽力有問題

科學家直到20世紀初才明白，嬰兒一出生就有聽覺。事實上，早在胎兒只有6個月大的時候，他的內耳就已發育完成了，只要外面的音響够大或够吵，他還會在母親的肚子裏拳打腳踢呢！

剛出生幾個小時的嬰兒，對於小的聲音或許沒有什麼反應，但是大一些的聲音，往往會讓他「嚇一大跳」。

曾有一位敏感的母親，在坐月子時就察覺到嬰孩聽覺有問題。事實上，新生兒聽力篩檢試驗是在出生後1星期內施行的。目前，新生兒專家都同意，為「高危險」新生

兒做聽力篩檢試驗，是早期發現幼兒「重聽」的必要工作之一。

4個月以上的嬰兒，由於腦神經系統漸漸發達，比較少有「驚嚇」的反應。不過，只要父母仔細觀察就可以發現，寶寶一聽到聲音，往往會眨一下眼皮，停止吸奶的動作，或愉快的「手舞足蹈」起來。這些反應都是在幾秒鐘內發生的反射動作，稍縱即逝。最重要的是，這個時期的嬰兒，對於輕柔的說話聲，漸漸有了「傾聽」的反應。

6個月大的嬰兒，聽到悅耳、新奇或對他特別有意義的聲音（如沖泡牛奶的聲音），會很快回過頭



去看。這種對聲源的「定位反射動作」就是嬰幼兒聽力檢查的最好指標。

父母親如果發覺，在呼喊6個月到1歲以內的寶寶名字時他很少回頭，或睡覺時不容易被吵醒，最好立刻帶他到醫院檢查。1歲以上還不會說話的孩子，如果在家經常用手勢、表情或動作來表達需要，父母親也應該要懷疑：「寶寶的耳朵聽得見嗎？」

目前，台灣地區較大醫院的耳鼻喉科，都設有聽力檢查室，由學有專長的聽力學技師為嬰幼兒做聽力檢查。只有在父母親和專業人員都提高警覺，密切配合之下，寶寶的「聽力」才不至遭到耽誤。

（心梅）

