




多施有機肥 可增加柳橙糖度

問 (1)我種植的柳橙，酸度一直沒辦法降低，請問如何增加糖度？

(2)爲何柳橙枝條和葉片到了冬天，都會長一種像綠苔的薄層，如何消除？（台南縣大內鄉二溪村其子瓦1號葉進忠）

答 (1)下列方法可增加柳橙糖度：①多施有機質肥料，②施用「鎂」肥，如苦土石灰、硝酸鎂，③樹體要有充分日照，④少用氮肥。

(2)是「青苔」類。防治法爲，①噴布「波爾多液」（硫酸銅4公克、生石灰4公克，再加水1公升）②注意剪枝，勿使枝條太茂密。（蔡雲鵬）

百香果 北部宜於3～5月種植

問 (1)在那個農場可購到大粒「百香果」的嫁接種苗？

(2)北部何時種植較好？（新竹縣關西鎮北山里6鄰34號范進文）



（阿郎 攝）

答 (1)百香果「台農一號」品種的嫁接種苗，請試向「台東種苗繁殖場」（電話(089)222089）洽詢。

(2)百香果本省全年均可種植，但北部地區以3～5月種植較爲適宜。（林瑩達）

天堂鳥 宜用種子繁殖

問 (1)天堂鳥可否用種子繁殖？
(2)天堂鳥開花後，每次人工授粉都不會結種子，與季節有關嗎？如何授粉，使它結種子？（台南縣善化鎮小新國小林永昌）

答 (1)天堂鳥以種子繁殖爲宜，也可用分株，但分株成活率不高，尤其季節不對時，易枯死。

(2)天堂鳥原生南非，本身較喜乾燥的氣候，結實和季節有關。人工授粉時，應使用他花授粉，柱頭成熟時，授粉才有效。（黃敏展）



（薛聰賢 攝）

葡萄園間作花生 產量不佳

問 如果想間作花生於茶園、甘蔗田、蘆筍、柑桔、葡萄園等，這些作物開始種植時，應如何留空地？（彰化縣福興鄉福興村福興路109莊福熾）

答 一般來說，葡萄園內最好不要間作花生，因葡萄葉子在棚架上，會遮住大部分日光，使得花生過度徒長，造成莢果種子收量極低。如果要間作，只能在葡萄植株尚小或剛種時種植。

茶園、甘蔗、蘆筍、柑桔園間作花生是可行的，間作花生的栽培法，首視茶樹（或甘蔗、蘆筍、柑桔）行間距離長短，再配合花生行距30～35公分種植。



政府徵收土地闢建公路

南投縣水里鄉上安村安村巷50~3
號黃雲龍先生問：

我有1塊土地，座落於新中橫公路
段，由於新中橫一再拓寬闢建，致使我的土地受公
路局徵收使用，形成零亂不堪，幾無耕作價值。請
問：

- (1)公路局徵收土地，是否須徵得地主的同意，
才能徵收使用？
- (2)土地徵收使用後剩餘部分，公路局是否應一
併賠償或整修？

高瑞鐸律師答覆：

國家因國防、交通、公用、水利、公共衛生、
公共建築、教育學術及慈善、國營等事業，以及其

事先不須徵得地主同意

他由政府興辦以公共利益為目的之事業，
得依土地法的規定，徵收私有土地。

為舉辦上述事業，徵收私人土地，須依
一定程序，層報行政院或省政府核准，但毋庸徵得
地主的同意（土地法第208條以下）。

又，徵收土地殘餘部分面積過小或形勢不整，
致不能為相當使用時，所有權人得要求一併徵收。
徵收的土地，因其使用影響於接連土地，致不能為
從來的利用，或減低其從來利用的效能時，該接連
土地所有權人，得要求需用土地機關為相當補償，
土地法第217條、216條第1項分別著有明文。來函
情形，可要求公路局一併徵收剩餘部分或為相當補
償。

花生直立型品種，平畦栽培行距為30~35公分，
株距6~10公分。

(1)茶園間作花生：一般在茶樹行間種植2~3行
花生，栽培季節以春作為優。

(2)甘蔗間作花生：在甘蔗行間種花生2~3行，
普通2行，春植秋植均可，通常花生先行播種，預留
插植甘蔗的行溝，或與甘蔗同時種植，其他栽培管理
與普通栽培同，花生收穫後即行甘蔗施肥培土。

(3)蘆筍、柑桔間作花生：需視柑桔或蘆筍行間距
離長短，依花生行株距30~35公分，進行種植。（曹
文隆）

木瓜幼苗雌雄 無科學方法鑑別

問 我種的木瓜已開花，可惜公多母少，有沒有方
法補救？如砍掉再種，再種時，如何選母苗？
結果半年還不會黃熟，如何促成早黃熟？（中壢市月
眉里 135~112號顏賴）

答 木瓜種至開花，發現太多雄株，想補救為時已
晚，雖可砍掉重種，但發育不良，容易徒長，
經濟價值低，只有植前慎選信用可靠的優良種苗，否
則宜每穴栽2~3株，等將來淘汰雄株。

木瓜幼苗雌雄鑑別，迄今尚無正確可靠的科學方
法。所以無法根據種子部位、大小、重量及苗高、根

羣分布、葉形變化等來鑑定性別。但選苗矮、節間短
者，將來為雌株的機會較多。

木瓜開花結果至採收所需時間，依品種、氣候、
管理而異，一般4~5月開花者，經3個半~4個月
即可黃熟採收，而11~12月開花者，須經長達6~7
個月才可黃熟，又若溫度低於16°C，木瓜即停止生
育而無法黃熟。疏果、加強肥培管理、果皮劃傷等可
促進黃熟。（王德男）



木瓜的雄花（阿豐攝）