

防治薊馬、蚜蟲、褐飛蟲最新藥劑

美國FMC公司繼「好年冬」農藥後最新發明之專利藥劑

新好年丹[®]

48.34%
乳劑

中華民國發明專利15年 經濟部中央標準局專利證書號碼第11356號

係註冊商標證號碼第132819號與第150722號

FMC[®] Marshal[®]


速效!

廣效!

安全!

低毒!

- 零售現金價
1000cc = 1400元
- 請向正豐加盟店
購買



新好年丹[®] 48.34% 乳劑

政府推廣於下列作物防治薊馬、蚜虫、褐飛蟲之使用方法

作物名稱	適用害蟲	每公頃(每次)用藥量	注 意 事 項
水稻	褐飛蟲	1.2公升/公頃(次) (1000倍)	採收前10天停止用藥
甘蔗	刺 蟲	0.5-0.7公升/公頃(次) (1500倍)	1.每隔7天噴藥一次。 2.採收前9天內停止用藥。 3.僅適用於包葉葉類。 4.採收時割去之外葉， 不得使用，應予燒 棄。
西瓜	淡色薊馬	0.6-1.2公升/公頃(次) (1500倍)	1.於薊馬開始發生時即行噴藥，每週噴藥一次，連續 不得超過四次。 2.採收前6天停止用藥。
芒果	薊 馬	1.5-2公升/公頃(次) (1000倍)	1.花謝後每隔10天噴藥一次，連續五次以上。 2.採收前21天內停止用藥。
柑 桔	薊 馬	1-2公升/公頃(次) (1000倍)	1.於花落後幼果期內噴藥二次。 2.採收前21天內停止用藥。
菠 蘿	假 薊 馬	0.2-0.5公升/公頃(次) (1500倍)	1.於薊馬發生時每隔7天噴藥一次，連續三次。 2.採收前25天停止用藥。
香 蕉	薊 馬	0.3公升/公頃(次) (1200倍)	於花苞吐出來前噴藥(約三天)，由花苞頂端切 處以注射器注入稀釋液(150、200公撮)約5秒。



正豐

化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(04)3393201-3



台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造廠：FMC Corporation
Agricultural Chemical Division