

2~3個月若發生雜草，可行拔除，以後每隔3~4個月舉行淺耕除草1次，操作時勿傷及茶樹根部或使茶樹根部動搖，茶樹四周的雜草，宜用手拔，不可鋤耕；在冬季時，可用中犁或小型中耕管理機，在每行的中央進行耕犁1次。另茶園施行全面敷蓋時，若有雜草發生，應用手拔除，當敷蓋材料腐爛時，則須再行敷蓋，每逢冬季茶園至少進行耕犁1次，即施行翻土、日晒、消毒，1個月後再行敷蓋新材料。

施肥

1.施肥量：視土壤性質、製茶種類、茶樹生長狀況而定，一般茶樹施用台肥1號或42號複合肥料，每公頃施肥量為第1年100~150公斤，第2年250~300公斤，第3年400~450公斤，第4年550~600公斤。

2.施肥時期：

(1)施肥次數：一般茶樹全年施肥分3次；春肥（1月）、夏肥（5月）與秋肥（8月）。

(2)施肥量：第1年種植後4個月，開始進行第1次施肥，以後間隔3個月再施1次，每次施肥量各為當年肥料施用量 $\frac{1}{3}$ ，第2年至第4年每次各為當年肥料量 $\frac{1}{3}$ 施用。

(3)施肥方法：宜用穴施或條施2種方法，施肥前，在距離茶樹20公分處，挖一個洞穴或開一條溝，深5~10公分，將肥料施於溝內，隨即用鋤頭或耕犁覆土。

此外，無敷蓋或局部敷蓋的茶苗，每年或隔年的冬季，最好每公頃加施豆粕6,000公斤，或垃圾堆肥15,000~20,000公斤，藉以改良土壤及增加土壤的肥力。

摘心與採摘

1.茶樹種植後3年之內，最忌摘心或採摘不當，目前本省茶園部分茶樹衰弱而且矮小，此乃幼木期採摘過度，實為主因之一。實際上，茶苗於種植剪頂後，當年不可採摘，僅將其特別徒長的枝條予以摘心，以抑制其長高，其餘的芽宜任其自然生長，以養成強壯的主枝。

2.第2年春季第1次所萌發之芽，必須等其充分成長後始可摘心，「6月白」和「白露」也須等待所發的芽充分成長後，再各行摘心1次。

3.第3年茶樹生長良好者，可待其新芽發育有一心5、6葉時進行一心一葉的採摘，全年採摘次數以5次或少於5次為原則。

4.第4年茶樹的樹冠逐漸增大，始可酌量增加採摘。

以上所介紹採摘方法，各位農友可視茶樹生育情形酌量調整。

剪枝

茶樹是多年生常綠的灌木，如果不加以適當的剪枝，養成茶樹高大，枝條粗而疏，採摘既極不便，而且又無法充分發揮其最高產量，實在有失經濟栽培的原則。

幼木期的剪枝，主要是壓制茶樹中央的徒長枝，使枝葉發展平衡，促進側枝的伸展，使樹冠擴大，構成良好的幼木樹型。

1.剪枝效益：

(1)壓制主枝徒長，增進側枝萌發，擴大採摘的面



原裝進口 歷史悠久

最純正
蓖麻籽粕

含有成分：
氮 5.5~6.5%
磷 2.8%
鉀 1.2%
有機物 82%

土壤改良 最佳有機質肥料

泰國蓖麻油工業公司(直接販售)

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社

服務處：(02)7044259 懷豐企業公司

(052)541017 林木榮 (045)874571 農友行

(036)663659 張金海 (089)322767 陳啓明 (036)882128 來時公司

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、甘蔗、蘿藦、花卉。