



圖5 茶樹生長狀態

積。

(2)使枝條分佈均勻，以利日光照射，萌芽整齊，既可改善品質且便利採摘。

(3)減少茶樹開花結實，促進鬚根發育，延長生產年限。

(4)減少或預防病虫害的發生與蔓延。

2.剪枝時期：一般在冬至前後，即12月上旬至次年1月上旬施行，但為調節產量，也可在春茶採收後進行剪枝。

3.剪枝型式：第1年離地面25~30公分處，施行

平行剪枝，第2、3年於去年剪枝位置上面，高5~10公分處施行平行剪枝，至第4年開始茶樹生長旺盛時，可於去年剪枝位置高5~10公分處進行淺弧型剪枝。若茶樹中央主枝特別強壯或徒長枝，宜於剪枝面低5公分處重剪，以促進翌年側枝平衡發展。

病虫害防治

在害虫發生面積不大，且不嚴重的茶園，盡量施行人工捕捉或施行點噴，切勿過分依賴農藥、濫用農藥，如此既可保護害虫天敵，還可減少抗藥性害虫產生，更不致有殘毒污染，有損飲茶人的健康。



不過，若以藥劑防治病虫害時，應先認清病虫害的種類，然後再依據政府推廣的防治藥劑及方法，對症正確施藥防治，施藥後尚應依照規定日數採摘；可能的話，最好先採摘，然後施藥，可收防治之效，且也安全，在此懇切盼望各位茶農切勿濫用農藥，害人害己，同時也期望植物保護人員加速生物防治的研究，減少農藥施用的機會，此外，注意加強茶園管理如合理施肥、勤於除草，以改善茶園環境等，均可減少害虫發生，可收預防之效。

線蟲的剋星

益收寶 粒劑 乳劑



專治地下爬的線蟲、切根蟲、效果最佳，具有觸殺、胃毒及燻殺作用，使用方便、毒性低。



※使用方法請就教於本公司技術員或零售店



富農化學工業股份有限公司
台北市漢口街一段61號