

一帶永逸的男性結紮

任宜蓀

談到男性結紮，一般人士會誤會為男士阉割，事實上是不相干的兩碼事，前者是去勢，將男性第一性徵即睪丸去除，導致男性特徵不明顯，娘娘腔，像古時代的太監。男性結紮只是將輸精管的通路截斷，使精液中無精虫，達到不懷孕的目的。

男士的結紮是最安全而簡單可靠的避孕方法之一，但常常是最容易被忽略的一種方法。甚至在較為盛行的美國及若干亞洲國家，最近幾年來有逐漸減少的趨勢，過去家庭計畫工作人員都認為男性結紮接受率之所以低，是因為：男士想表現其男性氣概，男人就心結紮有損性能力等。

但一般的統計告訴我們，男士結紮後並沒有任何不良的副作用，它只要在陰囊的表面處開一小切口，找出輸精管，將之切斷、封閉，精虫便無法排出。

手術後非常有效，每 100 次中

僅有少於 1 次的失敗。手術後必須經過數次的射精才能將貯存的精虫完全清除，因此手術後仍須使用其他方法避孕數周或數月，才不致發生意外懷孕。

手術本身危險性低，嚴重副作用也少，不少人也許會有輕微的腫脹、瘀傷、疼痛，不過很快就消失，少數人可能發生感染，死亡則是甚少，尤其如果消毒完全，死亡情形幾乎沒有。

手術後的照顧很簡單，如果可能，病人在手術後應在門診休息 1~2 小時，然後回家休息數小時，手術後 2~3 日內，不要從事勞動或費力的運動，佩帶睪丸托帶 7~8 日，同時服些輕度的鎮痛藥物或消炎藥，可以減除手術後的不舒服。傷口一般 10 日內癒合，如果切口處有腫脹、觸痛或發膿，表示受到感染，必須立刻找醫師診察，如果一切順利，就可開始性生活。

男士結紮是一種最有效的避孕

方法，大型的研究發現失敗率約在 0~2.2% 之間，一般都低於 1% 以下。一般避孕方法都以每 100 個婦女使用 1 年的懷孕數來評價，男性結紮則以每 100 個手術的懷孕數來評價，因此與其他避孕方法很難直接比較。雖然如此，男性結紮還是一項高效的方法。

至於失敗主因可能是：1. 在輸精管內的精虫尚未清除前，未配合其他避孕方法。

2. 輸精管自然再結合。

3. 手術時，切開及閉合錯誤的器官。

4. 很少的先天性多條輸精管，在手術時未注意到。

有些男士在手術後後悔了，一般要求復元手術的理由大約是離婚後再婚，或理想子女數中男孩死亡，或因家庭環境及經濟改善，希望再生等，其復元成功率約 65% 左右，故仍希望在作結紮手術前，抱定決心不要後悔最佳。

新興的水果 獼猴桃 小苗供應

● 簡介備索請附回郵 ● 栽培法每册僅收工本費 50 元

(一棵公株，六棵母株為一組)
一年生，今年特價每組 1000 元。
即日起接受訂貨，因數量不多，售完為止，
向隅者請再等一年。(訂金三成)
75 年 3 月初起供貨。

台大種苗 = 台大蘭園

彰化縣大村鄉大橋村中山路三段 137 號
郵政劃撥：0241336-7 帳戶賴本智

